








R&D-Plan






Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Untersuchungs- und Therapieräume

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
 Hautdesinfektion	vor Blutentnahmen vor Injektionen (i.v., s.c., i.m.)	Hautantiseptikum durch Sprühen oder Wischen mit keim- armen Tupfer auf die Punktionsstelle aufbringen	z.B. Octeniderm® farblos, 15 Sek. EWZ	medizini- sches Per- sonal
 Instrumente	sofort nach Ge- brauch oder Kontamination	Einweginstrumente ----- aufbereitbare In- strumente	Entsorgung in Sharps ----- geschlossen in Entsorgungscontai- ner zur Aufberei- tung geben	medizini- sches Per- sonal
 Thermometer BZ-Messgerät	nach Benutzung	Einmalhüllen nach jeder Anwendung entsorgen. Oberfläche voll- ständig desinfizie- rend abwischen	z.B. Mikrozyd® AF wipes, 1 Min. EWZ	medizini- sches Per- sonal
 Stauschlauch Stethoskop Blutdruck- manschette	nach Benutzung ----- bei sichtbarer Ver- schmutzung sofort	Oberfläche voll- ständig desinfizie- rend abwischen ----- Kontamination ent- fernen, dann Oberfläche voll- ständig mit Desin- fektionslösung ab- wischen	z.B. Mikrozyd® AF wipes, 1 Min. EWZ	medizini- sches Per- sonal
 Einwegdosier- pumpen	bei Flaschen- bzw. Kanisterwechsel	Mit jedem Flaschen-, Kanisterwechsel erneuern		medizini- sches Per- sonal
 PC-Tastaturen	1x Woche	Oberfläche desinfi- zierend abwischen.	z.B. Mikrozyd® AF wipes, 1 Min. EWZ oder Mikrozyd sensitive wipes, 1 Min. EWZ	medizini- sches Per- sonal
 Mobiltelefone	1x täglich	Oberfläche desinfi- zierend abwischen.	z.B. Mikrozyd® AF wipes, 1 Min. EWZ oder Mikrozyd sensitive wipes, 1 Min. EWZ	medizini- sches Per- sonal





R&D-Plan

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
 <p>Arbeits-/ Oberflächen</p>	<p>vor aseptischen Tätigkeiten z.B. (Blutentnahme, Verbandswechsel)</p> <p>-----</p> <p>bei sichtbarer Verschmutzung sofort</p>	<p>Feucht-Wisch-Methode, nicht nachtrocknen</p> <p>-----</p> <p>grobe Verschmutzung mit einem Tuch entfernen, anschließend Feucht-Wisch-Methode, nicht nachtrocknen</p>	<p>z.B. Mikrocid® AF wipex, 1 Min. EWZ</p>	<p>medizinisches Personal</p>
 <p>Untersuchungs-liege</p>	<p>nach Benutzung</p> <p>-----</p> <p>bei sichtbarer Verschmutzung sofort</p>	<p>Feucht-Wisch-Methode, nicht nachtrocknen</p> <p>-----</p> <p>grobe Verschmutzung mit einem Tuch entfernen, anschließend Feucht-Wisch-Methode, nicht nachtrocknen</p>	<p>z.B. Incidin® Plus 0,5%, 1 Std. EWZ</p> <p>-----</p> <p>z.B. Incidin® Plus 0,5%, 1 Std. EWZ oder Mikrocid® sensitive Wipes, 1 Min. EWZ</p>	<p>medizinisches Personal</p>
 <p>Kuscheltiere</p>	<p>2x Jahr und nach Bedarf</p>	<p>maschinelle Reinigung</p>	<p>Auftrag an die Hauswirtschaft</p>	<p>medizinisches Personal</p>
 <p>Spielzeug</p>	<p>1x Jahr und bei Verschmutzung</p>	<p>maschinelle oder manuelle Reinigung</p>	<p>milde Reinigungssubstanzen</p>	<p>medizinisches Personal</p>
 <p>Liegematten</p>	<p>1x Woche</p> <p>-----</p> <p>bei sichtbarer Verschmutzung sofort</p>	<p>Feucht-Wisch-Methode, nicht nachtrocknen</p> <p>-----</p> <p>grobe Verschmutzung mit einem Tuch entfernen, anschließend Feucht-Wisch-Methode, nicht nachtrocknen</p>	<p>z.B. Incidin® Plus 0,5%, 1 Std. EWZ.</p> <p>-----</p> <p>z.B. Incidin® Plus 0,5%, 1 Std. EWZ oder Mikrocid® sensitive Wipes, 1 Min. EWZ</p>	<p>medizinisches Personal</p>

R&D-Plan

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
 Kuscheldecken	2x Jahr ----- bei sichtbarer Verschmutzung sofort	maschinelle Reinigung	Auftrag an die Hauswirtschaft	medizinisches Personal
 Zier- und Sitzkissenbezüge	2x Jahr ----- bei sichtbarer Verschmutzung sofort	maschinelle Reinigung	Auftrag an die Hauswirtschaft	medizinisches Personal
 Kissenbezüge	personenbezogen alle 2 Wochen oder nach Gebrauch ----- bei sichtbarer Verschmutzung sofort	maschinelle Reinigung	in die Wäsche geben	medizinisches Personal
 Duschbecken	<u>nach</u> Benutzung	mechanisch reinigen, nicht nachtrocknen Einwirkzeit einhalten, anschließend mit klarem Wasser nachspülen	z.B. Perform® 1,5% EWZ von 5 Min. einhalten	medizinisches Personal