

Reisebericht

# „Äthiopien das Land der Extreme“



02.02 – 17.02.2018

Teilnehmerzahl: 6

Reiseleiter: Volker Sthamer



## Unsere Tour - Reiseziele



- 1 – Ziwaysee – Haile Resort
- 2 – Langanosee – Hara Lodge
- 3 – Yergalem – Aregash Lodge
- 4 – Goba – Wabe Shebele Hotel
- 5 – Awash NP – Awash Falls Lodge
- 6 – Doho - DohoLodge
- 7 - Bilen – Animalia Lodge
- 8 – Addis abeba – Jupiter Hotel

## Februar 02, 03 – Flug nach Addis Abeba und Fahrt nach Ziway

Früh am Morgen traf die Gruppe nach einem 6 ½ stündigen Nachtflug in Addis Abeba ein. Nachdem das Gepäck im Bus verstaut war ging es gleich weiter Richtung SW in den Afrikanischen Grabenbruch. Nach ca. 50 Km wartete auf uns in Debre Zeid ein Frühstücksbuffet und wir nutzten die Gelegenheit für eine Vorstellungsrunde in der auch wichtige Infos zur Reise gegeben wurden. Im Gelände der Lodge konnten erste Beobachtungen von Blaubrustspinten, Kappengeiern, verschiedenen Nektarvögeln, Graubrustparadiesschnäpper, usw. gemacht werden. Im Anschluss ging es weiter zum Ziwaysee den wir gegen Mittag erreichten. Der Ziwaysee ist mit ca. 440 Km<sup>2</sup> der drittgrößte See Äthiopiens und die Ufer sind für ihr Vogelreichtum bekannt. Von unserem, am See gelegenen Hotel machten wir am Nachmittag den ersten Ausflug entlang des Seeufers. Die Menge und Vielfalt an Vögeln war überwältigend. Wir konnten weit über 40 verschiedene Feuchtgebietsvogelarten, 13 Greifvogelarten, und etliche andere zählen.



Haubenzwergfischer



Guineataube



Graubürzel-Singhabicht JV

## Februar 04, 05, 06 – Fahrt zum Langanosee

Vor dem Frühstück haben wir das Gelände des Hotels erkundet und neben einer Dorfweberkolonie die fleißig am Nestbau war entdeckten wir einen Schopfadler, einen Schreiseeadlerhorst mit Jungen, Purpurmasken- und Doppelzahn Bartvögel, und etliche andere. Highlight war ein Blaßuhu der ziemlich frei auf einem Eukalyptusbaum saß und die ersten Sonnenstrahlen am Morgen genoss. Nach dem Frühstück ging es dann weiter in Richtung Langanosee mit einigen gezielten Stopps um weitere Eulen zu suchen. Konnten relativ einfach mit Hilfe lokaler Einwohnern den Grauhu, Schleiereule und Nordbüscheleulen finden. Nebenbei sahen wir weit über 100 Vogelarten – vom seltenen Blaubrüstspint über verschiedene Tokos, Lärmvögel, Nektarvögel, Mausvögel, usw.... bis zum Rotbauch-Mohrenkopf.

Am Abend erreichten wir die Hara Lodge, an der Ostseite des Langanosees, unsere Bleibe für die nächsten 3 Nächte .

Highlights während des Aufenthaltes waren unter vielen anderen die Endemiten: Wellenbartvogel, Shoapapagei, Tarantapapagei, Mönchspirol und Klunkeribis. Ferner konnten wir im Lodge Gelände und im nahe gelegenen Wald eine grosse Vielfalt typischer Vögel für den afrikanischen Grabenbruch beobachten: Feuerstirnbartvogel, Diadembartvogel, Olivtaube, Blaunackenmausvogel, Weißohrturako, Natalzwergfischer, Rotkehlwendehals, 3 verschiedene Honiganzeiger, Mohrenraupenfresser, Sattelstorch, Silberwangenhornvogel, verschiedene Tokos, Schreiseeadler, Pelikane um einige zu nennen.

Guereza Mantelaffen, Meerkatzen, Flusspferde, Kronenduiker und Graufusshörnchen kommen im Lodgegelände vor und waren leicht zu finden.



Eurasischer Wiedehopf



Grau-Uhu

## Februar 7 – Fahrt nach Yergalem via Hawassa

Früh haben wir die Lodge verlassen um ausreichend Zeit für Beobachtungen am Hawassasee zu haben. Dieser See mit 122 Km<sup>2</sup> gehört zu den kleineren im Äthiopischen Grabenbruch, beherbergt jedoch eine enorme Vielfalt an Feuchtgebietsvögeln. Highlights unserer Beobachtungen waren unter anderen : Purpur-, Glocken- und Küstenreiher, Haubenzwerg-, Senegal- und Graufischer, Purpurhuhn, Mohrensumpfhuhn, Kapralle, Afrikanische Zwergente, Spornhans, Marabus, usw., sowie etliche Limikole.

Am Nachmittag in der Aregash Lodge angekommen, machten wir eine kleine Wanderung durch die Kaffeeplantage und konnten die Tamburintaube, Heuglin Brillenvogel, Senegal Amarant und andere finden. Am frühen Abend, während der traditionellen Kaffeezeremonie, wurden wilde Hyänen und Kappengeier mit Küchenresten angelockt.



Tambourintaube



Tüpfelhyäne



Silberwangen-Hornvogel

## Februar 8, 9, 10 – Fahrt nach Goba / Bale Berge

Nach dem Frühstück ging es dann weiter über Hawassa und Shashamane in das östliche Hochland – die Bale Berge. Es war eine lange aber keineswegs langweilige Fahrt mit spektakulären Aussichten und Landschaften. Während der drei Tage die wir in den Bale Bergen verbrachten, konnten wir die Vielfalt der endemischen Vögel, Säugetiere und Pflanzen leicht finden und beobachten. Neben den Endemiten: Rougetralle, Strichelbrustkiebitz, Klunkeribis, Blauflügelgans, Rüppelzistensänger, Goldhalspieper, Braunnackenfrankolin, Schwarzkopfgirlitz und Weißrückenmeise, beeindruckte die Vielzahl an Greifvögeln auf dem Sanetti Hochplateau – Savannen-, Steppen-, Steinadler, Augurbussard, Falken und Habichte. Mit Hilfe eines Rangers konnten wir auch den Afrikanischen Waldkauz finden und beobachten. Nicht weniger spannend sind die endemischen Säugetiere in dieser Region, ziemlich einfach konnten wir den Bergnyala, den Menelik Buschbock den Äthiopischen Wolf und die Riesenmaulwurfsratte finden. Ferner sahen wir noch den Bohor Riedbock, Warzenschweine, einen Serval und die Schwarzkralen-Bürstenhaarmaus.



Augurbussard – Schwarze morph



Riesen Maulwurfsratte



Äthiopischer Wolf

## Februar 11 – Fahrt nach Awash NP

Früh am Morgen haben wir das Hochland verlassen Richtung NO. Vor uns lag eine 400 Km lange Fahrt in den östlichen Rift Valley. Wir durchquerten das größte Weizenanbaugebiet Äthiopiens und als wir bei Adama den Grabenbruch erreichten und nach Osten abbogen, änderte sich abrupt die Landschaft. Hier waren vor einigen 100 Jahren noch etliche Vulkane aktiv und die Gegend ähnelt einer Mondlandschaft. Während der Fahrt konnten wir unter anderem etliche Greifvögel, Geier und Falken sowie den endemischen Erzraben und Senegalracken sehen.



Senegalracke



Savannenadler

## Februar 12 – Awash NP und Fahrt nach Doho

Die Lodge in der wir übernachteten liegt an den Awash Wasserfällen und von der Restaurantterrasse aus konnten wir während des Frühstücks etliche Krokodile beobachten.

Es waren eigentlich 2 Tage im Awash NP vorgesehen. Da eine der wichtigen Strassen im Park nicht passierbar war haben wir entschieden weiter in eine ca 45 km entfernt liegenden Lodge zu fahren. Zuvor kreuzten wir den Park und konnten den Rosenwürger, Somali-, Rotkopf- und Rüppellwürger sowie den Schwarzbrust-Schlangennadler, Savannenadler, Graubürzel-Singhabicht, Gleitaar und andere sehen. Leider wird der Park sehr stark von Nomaden mit ihren Kamel- und Rinderherden genutzt, so dass die Tierwelt sehr begrenzt ist. Wir sahen : Sömmeringgazellen, Beisa Orix, Kleinkudu und Warzenschweine.

Zu Mittag erreichten wir die Doho Lodge und konnten während der Fahrt neben den Halsband-Zwergfalken noch Anubis- und Mantelpaviane sowie deren Hybride beobachten. Diese Lodge liegt an einem Sumpfgebiet das von etlichen heißen Quellen gespeist wird. Highlights waren hier die Wellenflughühner, Purpurreiher, Senegalfischer, Grünschwanzglanzstare, Gilb- und Dorfweber, Bandamadine, Grautoko, Glanz und Erznektarvogel. Im und um das Lodge Gelände konnten wir frische Löwenspuren entdecken, zu sehen bekamen wir leider keinen. Am Abend sind wir auf Nachtschwalben Suche gegangen und wurden auch fündig : Kurzschleppen-Nachtschwalben.



Gleitaar



Wellenflughuhn

## Februar 13, 14

Nach einer frühen Wanderung um das Lodge Gelände wo wir die Senegaltschagra, den Somalibindensänger, Wellenflughühner, Rotbauch-Mohrenkopf und etliche andere sahen, ging es dann 50 Km weiter nach Osten in das Bilen Gebiet wo wir für 2 Tage in der Animalia Lodge blieben. Von der Lodge blickt man in den Grabenbruch und auf ein Sumpfgebiet dass sich ca 200 Km Richtung Osten zieht. Dieses Sumpfgebiet wird von etlichen Heißwasserquellen gespeist und ist Habitat für eine Vielzahl von Vogel- und Säugetierarten. Am Nachmittag des ersten Tages konnten wir Kurzschleppen-Nachtschwalben finden und an einem kleinem Teich Karmin-, Blauwangen- und Zwergspinte, Senegaltriele, Kuh-, Mangroven, Rallen-, Purpur- und Nachtreiher, Feuerweber, Grau- und Malachitfischer, tausende Blutschnabelweber usw beobachten.

Zu den tropfenden Wasserhähnen im Lodge Gelände kamen Somaliammer, Schwarzschwanz, Sahelsteinsperling, Maskenwürger, Gurr-, Brillen-, Lach-, und Guineatauben, Mahaliweber, usw....

Am nächsten Morgen besuchten wir die Alleidege Ebene. Dies ist eine Trockenebene die eine sehr eigene Vogelwelt beherbergt. Alleidege ist seit 3 Jahren ein NP , gehörte zuvor zu einer Jagdkonzession. Die Säugetiere sind hier noch relativ scheu gewöhnen sich aber allmählich an die Besucher. Neben Braunbrust-Flughühnern, Arabertrappe, Somalistrauss und Sekretär, sahen wir noch etliche Vögel die diesem Habitat angepasst sind: Savannenadler, Gleitaar, Wiesen- und Steppenweihen, Weisswangen-, Harlekin-, Thekla- und Buschlerche, Schwarzstirnwürger, Helmpferlhühner, Gelbkehlfrankolin, Bindenrennvogel, Ohren- und Weissrückengeier, usw..... Wie im Awash NP konnten wir auch hier die Sömmeringgazelle, Beissa Oryx und Warzenschweine beobachten. Zusätzlich sahen wir noch das Gerenuk - Giraffengazelle und Goldschakale.

Am Nachmittag besuchten wir ein Afar Nomadendorf und konnten einen kleinen Einblick bekommen wie sie leben.



Erdhörnchen

## Februar 15, 16 – Fahrt nach Addis Abeba – Besuch eines Stadtparks

Am Tag 13 ging es dann zurück in die „Zivilisation“ nach Addis Abeba über die Stadt Debre Zeid wo wir an einem Kratersee zu Mittag aßen. Am Abend lud uns Tariku - Eigentümer von Yamatours, unser Touroperator vorort, in ein Restaurant in dem traditionelle Tänze aus den verschiedenen Regionen Äthiopiens gezeigt werden, ein.

Am letzten Tag mussten wir das Programm wegen Demonstrationen ändern und besuchten ein Park in Addis Abeba wo etliche Hochlandvögel beobachtet werden konnten: Kapdrossel, Tarantapapagei, Braudrongoschnäpper, Gambia Schneeballwürger, Schmetterlingsastrild, Senegalarant, usw...

Vor Abflug gab es noch ein Abendessen im Griechischem Club und somit gingen 14 erlebnisreiche Tage zu Ende.

Den Teilnehmern meinen herzlichsten Dank für die aktive Teilnahme an der Reise in der wir über 326 Vogelarten sahen, für den gezeigten Respekt gegenüber fremden Kulturen, für die Toleranz auch wenn immer nicht alles so wie in Deutschland war und für die Teilnahme an der Trinkwasser Aktion.

Weitere Fotos der Reise können bald hier betrachtet werden:

<https://ethiobirds.smugmug.com/New-uploads-Neue-Aufnahmen/Ethiopia-Jan-Feb-2018/>



Kapdrossel



Tarantapapagei

**Mit dieser Aktion konnten wir während der 14 Tage  
ca 700 Plastikflaschen vermeiden**



**Vielen Dank !**

**Bilder die wir nicht mehr sehen wollen**



## Artenliste Vögel (gesichtete Vogelarten 331)



<b>Struthionidae</b>
Somali Strauss
<b>Podicipedidae</b>
Zwergtaucher
<b>Phalacrocoracidae</b>
Kormoran
Riedscharbe
<b>Anhingaidae</b>
Schlangenhalsvogel
<b>Pelecanidae</b>
Rosapelikan
Rötelpelikan
<b>Ardeidae</b>
Nachtreiher
Rallenreiher
Kuhreiher
Mangrovereiher
Glockenreiher
Küstenreiher
Seidenreiher
Silberreiher
Purpureiher
Graureiher
Schwarzhalsreiher

Goliathreiher
<b>Scopidae</b>
Hammerkopf
<b>Ciconiidae</b>
Nimmersatt
Abdimstorch
Wollhalsstorch
Weißstorch
Sattelstorch
Marabu
<b>Threskiornithidae</b>
Sichler
Hagedash
Klunkeribis
Heiliger Ibis
<b>Phoenicopteridae</b>
Rosaflamingo
<b>Anatidae</b>
Gelbbrust-Pfeifgans
Witwenpfeifgans
Blaufügelgans
Nilgans
Sporngans
Glanzente

Afrikanische Zwergente
Krickente
Gelbschnabelente
Spießente
Hottentottenente
Knäkenente
Löffelente
<b>Accipitridae</b>
Gleitaar
Schwarzmilan
Gelbschnabel Milan
Schreiseeadler
Schmutzgeier
Kappengeier
Weißrückengeier
Sperbergeier
Ohrengeier
Schwarzbrust-Schlangenadler
Einfarb-Schlangenadler
Höhlenweihe
Steppenweihe
Wiesenweihe
Froschweihe

Graubürzel-Singhabicht
Zwergsperber
Augurbussard
Schreiadler
Schelladler
Savannenadler
Steppenadler
Steinadler
Silberadler
Schopfadler
<b>Sagittariidae</b>
Sekretär
<b>Falconidae</b>
Halsband-Zwergfalke
Rötelfalke
Turmfalke
Graufalke
Lannerfalke
Wanderfalke
<b>Numididae</b>
Helmpferlhuhn
<b>Phasianidae</b>
Schopffrankolin
Clappertonfrankolin

Braunnackensfrankolin
Gelbkehlfrankolin
<b>Rallidae</b>
Rougetralle
Mohrensumpfhuhn
Purpurhuhn
Teichhuhn
Kammbläßhuhn
Kapralle
<b>Otididae</b>
Arabertrappe
Oustalettrappe
Senegaltrappe
<b>Jacanidae</b>
Blaustirn-Blatthühnchen
<b>Recurvirostridae</b>
Stelzenläufer
<b>Burhinidae</b>
Senegaltriel
<b>Glareolidae</b>
Bindenrennvogel
<b>Charadriidae</b>
Flußregenpfeifer
Sandregenpfeifer

Hirtenregenpfeifer
Dreiband-Regenpfeifer
Seereggenpfeifer
Strichelbrustkiebitz
Schwarzschofpkiebitz
Spornkiebitz
Schwarzflügelkiebitz
Kronenkiebitz
<b>Scolopacidae</b>
Sanderling
Zwergstrandläufer
Temminckstrandläufer
Kampfläufer
Bekassine
Afrikanische Bekassine
Uferschnepfe
Teichwasserläufer
Grünschenkel
Waldwasserläufer
Bruchwasserläufer
Flußuferläufer
<b>Laridae</b>
Graukopfmöwe
Heringsmöwe

<b>Sternidae</b>
Lachseeschwalbe
Weißflügel-Seeschwalbe
<b>Pteroclididae</b>
Braunbauch Flughuhn
Wellenflughuhn
<b>Columbidae</b>
Waaltaube
Tamburintaube
Stahlflecktaube
Kaptäubchen
Zimttaube
Oliventaube
Guineataube
Weißringtaube
Felsentaube
Halbmondtaube
Brillentaube
Gurrttaube
Lachtaube
Trauerturteltaube
Palmtaube
<b>Psittacidae</b>
Rotbauch-Mohrenkopf

Schoapapagei
Tarantapapagei
<b>Musophagidae</b>
Weißohrturako
Nacktkehl-Lärmvogel
Weißbauch-Lärmvogel
<b>Cuculidae</b>
Weißbrauenkuckuck
<b>Strigidae</b>
Grauhu
Blaßuhu
Afrikanischer Waldkauz
Schleiereule
Nord Büscheleule
<b>Caprimulgidae</b>
Kurzschleppen-Nachtschwalbe
<b>Apodidae</b>
Palmensegler
<b>Coliidae</b>
Blaunacken-Mausvogel
Braunflügel-Mausvogel
<b>Alcedinidae</b>
Graukopfliest

Senegalliest
Streifenliest
Natalzwergfischer
Haubenzwergfischer
Graufischer
<b>Meropidae</b>
Zwergspint
Blaubrustspint
Blauwangenspint
Karminspint
<b>Coraciidae</b>
Strichelracke
Senegalracke
Gabelracke
<b>Phoeniculidae</b>
Schwarzschnabel-Baumhopf
Mohrensichelhopf
Goldschnabelhopf
<b>Upupidae</b>
Wiedehopf
<b>Bucerotidae</b>
Sudanhornrabe
Rotschnabeltoko
Östlicher Gelbschnabeltoko

Von der Decken Toko
Hemprichtoko
Grautoko
Silberwangen-Hornvogel
<b>Capitonidae</b>
Feuerstirn-Bartvogel
Diadembartvogel
Wellenbartvogel
Purpurmasken-Bartvogel
Doppelzahn-Bartvogel
Perlenbartvogel
<b>Indicatoridae</b>
Strichelstirn-Honiganzeiger
Schwarzkehl-Honiganzeiger
Nasenstreif-Honiganzeiger
<b>Picidae</b>
Rotkehl-Wendehals
Nubierspecht
Kardinalspecht
Namaspecht
Graukopfspecht
<b>Alaudidae</b>
Buschlerche
Theklalerche

Weißwangenlerche
Harlekinlerche
<b>Hirundinidae</b>
Erzschwalbe
Braunkehl-Uferschwalbe
Uferschwalbe
Steinschwalbe
Rauchschwalbe
Mehlschwalbe
<b>Motacillidae</b>
Schafstelze
Gebirgsstelze
Langschwanzstelze
Bachstelze
Zimtspornpieper
Langschnabelpieper
Rotkehlpieper
Goldhalspieper
<b>Campephagidae</b>
Mohrenraupenfresser
<b>Pycnonotidae</b>
Graubülbül
<b>Turdidae</b>
Braunrückenrötel

Natalrötel
Heckensänger
Gartenrotschwanz
Schwarzkehlchen
Steinschmätzer
Nonnensteinschmätzer
Braunbrust-Steinschmätzer
Isabellsteinschmätzer
<u>Rüppel-Steinschmätzer</u>
Schwarzschwanz
Almenschmätzer
Rotbauschmätzer
Schluchtenrötel
Steinrötel
Orangedrossel
Akaziendrossel
Kapdrossel
Afrikadrossel
<b>Sylviidae</b>
Gartenrohrsänger
Basrarohrsänger
Dornspötter
Gelbbauch-Eremomela
Rotzügelsylvietta

Fitis
Zilpzalp
Mönchsgrasmücke
Klappergrasmücke
Braungrasmücke
<b>Cisticolidae</b>
Boranzistensänger
RüPELLzistensänger
Akaziensänger
Rahmbrustprinie
Grünmantel-Bogenflügel
Somalibindensänger
<b>Muscicapidae</b>
Braundrongoschnäpper
Senegaldrongoschnäpper
Strichelkopfschnäpper
Dunkelschnäpper
<b>Monarchidae</b>
Graubrust-Paradiesschnäpper
<b>Platysteiridae</b>
Lappenschnäpper
Heuglinschnäpper
Kongobatis
Däumlingsschnäpper

<b>Timaliidae</b>
Mönchsalcippe
Weißbürzeldrossling
Singtimalie
<b>Paridae</b>
Weißrückenmeise
RüPELLmeise
<b>Nectariniidae</b>
Rotbrust-Glänzköpfchen
Tacazzenektarvogel
Waldnektarvogel
Erznektarvogel
Elfennektarvogel
Bindennektarvogel
Glanznektarvogel
<b>Zosteropidae</b>
Somalibrillenvogel
Heuglinbrillenvogel
<b>Laniidae</b>
Fiskalwürger
Somaliwürger
Maskenwürger
Graumantelwürger
Isabellwürger

Rotkopfwürger
RüPELLwürger
<b>Malaconotidae</b>
Graukopfwürger
Orangebrustwürger
Rosenwürger
Senegaltschagra
Gambia-Schneeballwürger
Trauerwürger
Boubouwürger
Brubruwürger
<b>Oriolidae</b>
Mönchspirol
<b>Dicruridae</b>
Trauerdrongo
<b>Corvidae</b>
Kapkrähe
Schildrabe
Borstenrabe
Erzrabe
Alpenkrähe
<b>Sturnidae</b>
Zimtflügelstar
Grünschwanz-Glanzstar

Schweifglanzstar
Dreifarben-Glanzstar
Amethystglanzstar
Lappenstar
Rotschnabel-Madenhacker
<b>Passeridae</b>
Swainsonsperling
Maronensperling
Buschsteinsperling
Sahelsteinsperling
<b>Ploceidae</b>
Büffelweber
Starweber
Weißbrauenweber
Scharlachweber
Baglafechtweber
Zwergweber

Brillenweber
Gilbweber
Dorfweber
Maronenweber
Blutschnabelweber
Feuerweber
Samtweber
Canabis weber
<b>Estrildidae</b>
Gelbbauchastrild
Sumpfastrild
Wellenastrild
Schmetterlingsastrild
Buntastrild
Senegalarant
Bandamadine
Kleinelsterchen

Afrikasilberschnabel
<b>Viduidae</b>
Dominikanerwitwe
Rotfußwitwe
<b>Fringillidae</b>
Dünnschnabelgirlitz
Streifengirlitz
Reichenowgirtitz
Weißbauchgirtitz
Strichelgirtitz
Rüppelgirtitz
Schwarzkopfgirtitz
<b>Emberizidae</b>
Hausammer
Somaliammer



# Artenliste

## Sonstige Tierarten



Endemisch

Anubis Pavian
Mantel Pavian
Hybrid Anubis x Mantelpavian
Guereza Mantelaffe
Äthiopien Grünmeerkatze
Flecken Hyäne
Äthiopischer Wolf
Gold Schakal
Serval
Weißschwanzzichneumon
Warzenschwein
Erdhörnchen
Graufußhörnchen
Riesen Maulwurfsratte
Schwarzkrallen-Bürstenhaarmaus
Klippschliefer

Flusspferd
Kleinkudu
Berg Nyala
Kronenducker
Menelik Buschbock
Eritrea Dikdik
Sömmering Gazelle
Giraffen Gazelle
Gemeiner Riedbock
Beisa Spiessbock
Nilkrokodil
Nilwaran
Blaukehlgame
Laubfrosch
Gecko