

***Chlorophyllum brunneum* (Farl. & Burt) Vellinga**
 (= *Macrolepiota rhacodes* var. *bohemica* (Wichanský) Bellù & Lanzoni)



Apagador menor, parasol de carne rojiza
 © Javier Marcos

***Macrolepiota procera* (Scop.) Singer**



Apagador, galamperna, matacandelas, parasol
 © Miguel Ángel Pérez-De Gregorio y Pedro Sepúlveda

***Macrolepiota fuliginosa* (Barla) Bon**



Parasol
 © Miguel Ángel Ribes

	<i>Chlorophyllum brunneum</i>	<i>Macrolepiota procera</i>	<i>Macrolepiota fuliginosa</i>
Sombrero	Grande, globoso a trapezoidal, luego plano, con mamelón central pardo rojizo y grandes escamas del mismo color	Grande, ovoide a aplanado, con mamelón central liso y grandes escamas marrones	Grande, globoso a plano convexo, mamelón central marrón rojizo y grandes placas escamosas
Pie	Largo, hueco, fibroso, con base muy bulbosa, liso, se mancha de pardo rojizo intenso en la base al manipular	Largo, hueco, fibroso, con base bulbosa, atigrado, no cambia de color al manipularlo	Largo, hueco, fibroso, base fuertemente bulbosa, atigrado, rojo al frotamiento
Anillo	Membranoso, persistente, robusto, doble, móvil	Membranoso, persistente, doble, móvil, blanco por arriba, oscuro por debajo	Membranoso, persistente, doble, móvil, blanco por arriba, oscuro por debajo
Olor y sabor	Olor a patata o rábano, sabor poco diferenciado	Olor agradable, sabor a avellana	Olor agradable y sabor a frutos secos
Observaciones	<i>Macrolepiota fuliginosa</i> , antes de ser especie independiente, se ha considerado una variedad o forma de <i>Macrolepiota procera</i> , por tanto la consideramos como comercializable y, sin duda, se ha vendido una por otra confundida frecuentemente. Se diferencian principalmente por el enrojecimiento de la carne en el pie en <i>M. fuliginosa</i> . <i>Chlorophyllum brunneum</i> , ligeramente tóxica, se diferencia por su pie liso y su enrojecimiento intenso, sobre todo en la base.		