

## Übungsblatt 5 zur Modelltheorie

Sommersemester 2007

**Aufgabe 1:** Zeige: Sind  $L \subseteq L'$  Sprachen, so gilt  $\text{Tm}(L) \subseteq \text{Tm}(L')$  und  $\text{Fml}(L) \subseteq \text{Fml}(L')$ .

**Aufgabe 2:** Zeige das Koinzidenzlemma: Seien  $L \subseteq L'$  Sprachen,  $\mathcal{A}$  eine  $L'$ -Struktur und  $\mathcal{B} := \mathcal{A}|_L$ . Dann gilt für alle  $L$ -Terme  $t(x_1, \dots, x_n)$  und alle  $a_1, \dots, a_n \in A$

$$t^{\mathcal{A}}[a_1, \dots, a_n] = t^{\mathcal{B}}[a_1, \dots, a_n].$$

Außerdem gilt für alle  $L$ -Formeln  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  und  $a_1, \dots, a_n \in A$

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \mathcal{B} \models \varphi[a_1, \dots, a_n].$$

**Aufgabe 3:** Sei  $\varphi$  eine Formel,  $x_1, \dots, x_n$  paarweise verschiedene Variablen und  $t_1, \dots, t_n$   $L$ -Terme, in denen keine Variablen vorkommen, die in  $\varphi$  vorkommen. Sei  $h$  eine Belegung der  $L$ -Struktur  $\mathcal{A}$ . Zeige

$$\mathcal{A} \models \varphi(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)[h] \iff \mathcal{A} \models \varphi[h \left( \begin{matrix} x_1 \\ t_1^{\mathcal{A}}[h] \end{matrix} \right) \cdots \left( \begin{matrix} x_n \\ t_n^{\mathcal{A}}[h] \end{matrix} \right)].$$

**Aufgabe 4:** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $L$ -Struktur,  $B := \{b_1, \dots, b_m\} \subseteq A$ ,  $\#B = m$ ,  $\varphi(x_1, \dots, x_n) \in \text{Fml}(L(B))$ ,  $y_1, \dots, y_m$  Variablen, die in  $\varphi$  nicht vorkommen und

$$\psi(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) := \varphi(\bar{b}_1/y_1, \dots, \bar{b}_m/y_m) \in \text{Fml}(L).$$

Zeige, daß für alle  $a_1, \dots, a_n \in A$  gilt

$$(\mathcal{A}, A) \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \mathcal{A} \models \psi[a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m].$$

**Aufgabe 5:** Bezeichne  $L_{\mathbb{R}}$  die Sprache der Ringe und  $\mathbb{P}$  die Menge der Primzahlen. Für jedes  $p \in \mathbb{P}$  sei  $\mathbb{F}_p$  der Körper  $\mathbb{Z}/(p)$  aufgefaßt als  $L_{\mathbb{R}}$ -Struktur. Sei  $\mathcal{U}$  ein freier Ultrafilter auf  $\mathbb{P}$ . Zeige, daß das Ultraprodukt

$$\mathcal{A} := \prod_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{F}_p / \mathcal{U}$$

der  $\mathbb{F}_p$  nach  $\mathcal{U}$  ein Körper der Charakteristik 0 ist.

**Aufgabe 6:** Es bezeichne  $L_{=} := (\emptyset, \emptyset, \emptyset)$  die sogenannte Sprache der reinen Identität, in der es keine Relations-, Funktions- und Konstantenzeichen gibt. Man finde eine Klasse von  $L_{=}$ -Strukturen, die abgeschlossen unter elementarer Äquivalenz, aber nicht axiomatisierbar ist.

**Abgabe** bis Dienstag, den 29. Mai 2007, um 14 Uhr.