

Gesichts-Ausdrücke



Ohren hinter vertikalen oder flach zurückgedreht (beide oder nur eins) $\geq 5s$; wiederholt flach anlegen.



Augenlider geschlossen oder halb geschlossen für 2-5



Sklera (weiße im Auge) ausgesetzt.




Intensiver Blick für 5s.



Mund offen \pm geschlossen wiederholt mit Trennung der Zähne, für $\geq 10s$.



Zunge freiliegend, hervorstehend oder heraushängende und / oder ein- und ausziehend.



Gebiss auf einer Seite durch den Mund gezogen (links oder rech)

Haltung und Kopf-bewegung



Wiederholte Änderung der Kopfposition (auf / ab)



Kopf verworfen oder wiederholtes werfen.



Kopf vor der Senkrechten ($>30^\circ$) für $\geq 10s$.



Kopf hinter der Senkrechten für $\geq 10s$.




Kopfposition ändert sich regelmäßig, hin und her geworfen oder verdreht, ständig korrigiert.

Schweif-haltung und bewegung



Schweif fest in die Mitte geklemmt oder zur Seite gehalten.



Schweif schlagen große Bewegungen: wiederholt auf und ab/ von Seite zu Seite / kreisförmig; während Übergängen.

24 Verhalten, die SCHMERZEN im GERITTENEN PFERD anzeigen

Geradheit des Körpers



Die Hinterbeine folgen nicht den Spuren der Vorderbeine, sondern weichen nach links oder rechts ab. Auf 3 Spuren im Galopp.



Wiederholter Beinwechsel im Galopp; wiederholtes falsches angaloppieren; vorne und/ oder hinten uneinheitlich im Galopp.



Spontane Gangänderungen (z.B. vom Galopp zum Trab oder Trab zum Galopp brechen).



Stolpert oder fängt Zehen wiederholt.

Geschwindigkeit der Gangart



Ein hastiger Gang (Häufigkeit der Trabschritte $> 40/15s$); unregelmäßiger Rhythmus im Trab oder Galopp; wiederholte Geschwindigkeitsänderungen im Trab oder Galopp.



Gang zu langsam (Häufigkeit der Trabschritte $< 35/15s$); Passage artiger Trab.

Bereitschaft vorwärts zu gehen Gehorsam gegenüber Hilfen



Die Zurückhaltung sich vorwärts zu bewegen (muss getreten werden / verbale Ermutigung), stopped spontan.



Plötzlicher Richtungswechsel gegen Reiterrichtung; erschrecken.

Buckeln und Steigen



Steigen (beide Vorderbeine vom Boden).



Buckeln oder ausschlagen (ein oder beide Beine).



EQUITOPIA

Forschungs-kredit: Sue Dyson FRCVS
Vollständige Studie erhältlich unter
sue.dyson@aol.com



Vollständiger Kurs: 'Wie man die 24 Verhaltensweisen, die auf Schmerzen im gerittenen Pferd hinweisen, erkennt.' - Verfügbar unter: www.equitopiacycenter.com

Einige Ausdrücke/ Verhaltensweisen müssen zeitlich festgelegt und/oder auf Häufigkeit überwacht werden, sodass statische Fotos nicht allein zur Beurteilung der Lahmheit verwendet werden können. Die Bilder auf diesem Poster sollen das im Kurs enthaltene Material ergänzen und nicht ersetzen: 'Wie man die 24 Verhaltensweisen, die auf Schmerzen im gerittenen Pferd hinweisen, erkennt'.