

Name: _____

1) Bitte tragen Sie in nachfolgendes Schema die aufgeführten Befunde ein

- 18 zur Extraktion vorgesehen, 28 fehlt, 38 und 48 nicht sichtbar
- 21 Krone, Kronenränder abstehend, wurzelgefüllt, Zustand nach WSR, Vopr negativ
- 14 fehlt, Lücke von distal geschlossen
- PSI: Grad II im ersten und vierten Sextanten, Grad III in allen anderen Sextanten
- Kompositfüllung 26 mo + do, an 22 distaler ECKaufbau mit insuffizientem Füllungsrand, Keramikinlay 15 mod, Goldinlay mod an 45. Karies 36 bukkal.

															PSI Vopr		
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28		
Befund vor Beginn der Behandlung			55	54	53	52	51	61	62	63	64	65	L				
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V					
am 19																	
			85	84	83	82	81	71	72	73	74	75					
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38		
															Vopr PSI		

2) Für die okklusale Kariesdiagnostik trifft zu:

- eine Braunverfärbung der Fissur mit einem durchscheinenden grau-braunen Hof deuten auf eine Kariesausbreitung ins Dentin hin
- die Entdeckung von demineralisierten Fissureneingängen wird durch gründliche Trockenlegung und Trockenblasen mit dem Luftbläser erleichtert
- vorher muss eine Reinigung der Fissuren mit dem Salzstrahlgerät erfolgen
- durch Sondieren mit der Sonde wird die Trefferquote gegenüber der alleinigen Inspektion deutlich verbessert

3) Im Zusammenhang mit der Interdentalhygiene trifft zu:

- Für jeden Interdentalraum soll ein frischer Abschnitt Zahnseide verwendet werden
- Interdentalbürstchen sind bezüglich der Reinigungswirkung effektiver als Zahnseide
- Die Auswahl der Curaprox-Interdentalbürstchen erfolgt mit Hilfe einer farblich markierten Kalibrierungssonde
- Die ausgewählte Bürstchengröße (Farbe) muss dokumentiert werden

4) Welche Aussage zur speziellen Mikrobiologie pathogene Keime sind richtig ?

- *Actinobacillus actinomycetemcomitans* produziert ein Leukotoxin das auf Leukozyten tödlich wirkt.
- Erhöhte Östrogen- und Progesteronplasmalevels während der Schwangerschaft hemmen das Wachstum von *Prevotella intermedia*.
- *Fusobacterium nucleatum* spielt möglicherweise eine entscheidende Rolle beim Übergang einer Gingivitis in einer Parodontitis.
- Manche Parodontitiserreger sind in der Lage in die Weichgewebe einzudringen

5) Röntgen: Welche Aussage trifft zu?

- Die Röntgen-Kontrollnummer wird vor dem Röntgen bei der Kurshelferin erfragt.
- Die gelbe/blauere Röntgenkarte wird in der Karteikarte des Patienten aufbewahrt.
- Bissflügel werden in Halbwinkeltechnik angefertigt
- Bissflügel werden in Paralleltechnik angefertigt

6) Für die **Aufklärung des Patienten über bestimmte Behandlungsmaßnahmen trifft zu:**

- Sie kann problemlos an Hilfspersonal (Zahnarthelferin) delegiert werden.
- Sie muss schon vor Aufnahme eines klinischen Befundes erfolgen.
- Sie muss in schriftlicher Form dokumentiert und vom aufklärenden Zahnarzt, vom Patienten bzw. dessen gesetzlichem Vertreter und nach Möglichkeit von einem Zeugen (z.B. Zahnarthelferin) unterschrieben werden.
- Aufklärungsformulare, die alle möglichen Komplikationen beinhalten, ersetzen das Arzt-Patienten-Gespräch.

7) Dokumentation

Ein Patient kommt zur Füllungstherapie an 16 in Ihre Behandlung.
Sie injizieren 1,2 ml UDS, legen einen Kofferdam und fertigen nach vollständiger Kariesentfernung mit Filtek A2 eine mod Kompositfüllung an. Abschließend Fluoridierung mit Elmex Fluid. Wie sieht der Karteikarteneintrag aus?

8) Welche Aussage(n) zur **Endodontie ist/sind zutreffend?**

- Vor Behandlungsbeginn sollte ein diagnostisches Röntgenbild vorliegen.
- Der Patient muss vor Behandlungsbeginn über Prognose und Komplikationsmöglichkeiten nur mündlich aufgeklärt werden.
- Vor jeder Wurzelkanalfüllung muss eine Masterpoint-Aufnahme angefertigt werden
- Der Masterpoint sollte mindestens die ISO-Größe 30 haben und darf im geraden Kanal nicht klemmen.

9) Für die **Step-Down-Technik trifft zu:**

- ... Sie ist geeignet für gerade bis mäßig gekrümmte Wurzelkanäle.
- ... Die Endometrie (z.B. Root ZX) erfolgt vor der Messaufnahme.
- ... Die koronale Aufbereitung erfolgt nach der apikalen Aufbereitung.
- ... Die apikale Aufbereitung wird mit der Balanced-force-Technik und Hedströmfeilen durchgeführt.

10) Welche Aussagen zur **Reinigung / Desinfektion treffen zu:**

- ... Bei den Instrumenten (z.B. Sonde) auf dem Schwebetisch genügt eine gründliche Sprühdesinfektion
- Schwebetisch, Einheit und Arbeitsflächen werden nach jeder Behandlung mit Desomed Rapid desinfiziert (Wischdesinfektion)
- Das Bohrerbad (Grotanat) muss täglich gewechselt werden
- ... Abformungen werden für 1 h zur Desinfektion in das Impresept Bad gelegt