

Die Käferwelt der Umgebung Klagenfurts, besonders jene der Satniz.

Von Edgar Klimsch,

(Nachtrag und Berichtigung.)

Um die Aufzählung aller im Umkreis einer Stunde um Klagenfurt gesammelten Käferarten möglichst vollständig zu machen, erlaube ich mir gleich jetzt jene Arten zu nennen, die ich aufzuzählen übersehen habe oder die mir erst in diesem Jahre, als der hiesigen Fauna angehörig, bekannt geworden sind. Zugleich muß ich auch jene Käfer anführen, deren Nennung auf einem Irrthum beruhte, indem sie theils mit anderen Arten verwechselt, theils, wie es sich später herausstellte, von anderen Fundstellen bezogen wurden. Als in meinem Verzeichniß noch nicht aufgezählt müssen folgende Lederflügler erwähnt werden: *Bembidion fasciolatum* Duft v. *caeruleum* Dej. Findet sich mit der viel häufigeren Stammform vermischt an sandigen Bachesufern in der Satniz.

Pterostichus elongatus Duft. Zwei von Herrn Otto in Wien bestimmte Stücke erbeutete Herr Lehrer Pehr an Mauern innerhalb der Stadt.

Amara rufipes Dej. Ein Stück fand ich unter einem Stein im Garten des Knabenseminars.

— *aulica* Panz. Maria Saaler Berg, unter Steinen, nicht häufig.

Diachromus germanus L. Satniz, nur einmal in einem morschen Baumstrunk gefunden.

Hydroporus granularis L. In den Tümpeln hinter Weidmannsdorf, ziemlich selten.

— *tristis* Payk. Von Herrn Pehr in Teichen bei Krumpendorf in Mehrzahl gefangen.

Agabus Solieri Aubé. Ebendort von Herrn Pehr gesammelt.

Laccobius alutacens Thoms. Ebendasselbst, ziemlich selten.

*Cercyon aquaticum** Lap. Ein Stück erhielt mein Bruder beim Sieben von nassem Moos in der Satniz.

— *lugubre* Payk. Ebendort in Rindermist, nicht selten.

Megasternum obscurum Marsh. Im Ebenthaler Wäldchen bei faulenden Pilzen, nicht häufig.

Sphaeridium scarabaeoide L. v. *lunatum* F. In Gesellschaft der Stammform, ziemlich selten.

- Aleochara bilineata** Gyllenh. Bei St. Georgen aus Moos gesiebt, selten.
- Stenus rubra* Er. Bei Ebenthal in morschen Baumwurzeln nur ein Stück gefangen.
- Conurus littoreus* L. Unter der Rinde von faulenden Strünken, beim Pulverthurm, nicht selten.
- Bryocharis formosa* Gravh. Satniß, in morschen Baumstämmen, selten.
- Mycetoporus splendens** Marsh. Ebendort, im Moos, ziemlich häufig.
- *clavicornis** Steph. Ebendort gesiebt, ziemlich selten.
- Staphylinus erythropterus* L. Unter faulendem Buchenlaub in der Satniß nur in einem Stück gefunden.
- Philonthus decorus** Gravh. Satniß, von meinem Bruder aus Moos gesiebt.
- Othius lapidicola** Kiesw. Ebendort durch Sieben erhalten.
- Trogophloeus dilatatus** Er. Ebendort, in feuchtem Moos, selten.
- Megarthus sinnaticollis* Lac. Ein Stück erbeutete ich auf aufgeschichtetem Holz im Priesterhaus.
- Micropeplus porcatus** Payk. Satniß, unter Buchenlaub, hier ziemlich selten.
- Bryaxis antennata** Aubé. Ebendort aus Moos gesiebt, nicht häufig.
- Choleva angustata* F. Bei Ebenthal an faulenden Pilzen, nur einmal gefunden.
- Sciodrepa Watsoni* Spence. Satniß, an Nas, nicht sehr häufig.
- Catops nigricans* Spence. Ueberall an kleinerem Nas, nicht selten.
- Hydnobius strigosus* Schmidt. Bei Ebenthal in faulenden Schwämmen, nur ein Stück gefunden.
- Clambus minutus** Sturm. Satniß, im Moos und unter abgefallenem Laub, nicht häufig.
- Epuraea longula** Er. Ebendort gesiebt, ziemlich selten.
- *angustata** J. Sahlberg. Ebendort, nicht häufig.
- *rufomarginata** Steph. Ueberall im Moos, nicht häufig.
- Rhizophagus depressus* F. Von meinem Bruder unter Baumrinden beim Pulverthurm gesammelt.
- Prostomis mandibularis* F. Satniß, ein Pärchen fand ich in einem morschen Baumstrunk.

*Laemophloeus ferrugineus** Steph. Satniß, aus Moos gesiebt, ziemlich selten.

*Curimus erinaceus** Reitt. Bei Winflern aus faulendem Laub gesiebt.

Seminolus gigas F. Findet sich nach der Mittheilung des Herrn Behr unter Steinen am Ramm der Satniß.

— luniger Germ. Von Herrn Behr am gleichen Ort gesammelt.

*Hister ruficornis** Grimm. Satniß, in Ameisennestern unter Moos, selten.

Paromalus complanatus Panz. Unter der Rinde von Baumstrünken in der Nähe des Pulverthurms, nur ein Stück gefunden.

*Acritus nigricornis** Hoffmann. Satniß, unter faulendem Laub, ziemlich selten.

Polyphylla fullo L. Ein lebendes Stück fand ich vor meiner Wohnung auf der Straße liegend.

Melolontha hippocastani F. v. *nigricollis* Muls. Bei Ebenthal und Goritschitzen in Gesellschaft der Stammform, ziemlich häufig.

— *vulgaris* F. v. *lugubris* Muls. Ein Stück erbeutete ich auf einem Kastanienbaum im Seminarsgarten.

— — F. v. *ruficollis* Muls. Bei Goritschitzen in Gesellschaft der Stammform auf Eichen, ziemlich selten.

Throscus obtusus Curt. Satniß, von halb verdorrttem Gebüsch geklopft.

Elater erythrogonus Müll. Ebendort, im Frühling in morschen Baumwurzeln, nicht sehr selten.

Steatoderus ferrugineus L. Soll nach Mittheilung des Herrn Behr in der Ebenthaler Allee beobachtet worden sein.

Adrastus axillaris Er. Satniß, auf Gebüsch, nicht selten.

Helodes minuta L. Ueberall auf Schilf und Gebüsch in der Nähe von Bächen, ziemlich häufig.

Cyphon padi L. v. *discolor** Panz. Satniß, auf Gebüsch und unter abgefallenem Buchenlaub, nicht selten.

— — v. *gratiosus** Kolen. Ebendort, in Gesellschaft der Stammform, seltener als die vorige Abart.

Hydrocyphon deflexicollis Müll. Satniß, auf Gebüsch an Wasserrändern, nicht häufig.

Metacantharis haemorrhoidalis F. Ebendort, auf Gesträuch, nicht häufig.

- Rhagonycha nigriceps* Waltl. Auf Nadelbäumen in der Satnitz, ziemlich selten.
- Anthocomus fasciatus* L. Nur einmal auf einer Wiese bei Ebenthal gestreift.
- Aspidiphorus orbiculatus** Gyllh. Satnitz, nur einmal aus feuchtem Moos gefiebt.
- Gonodera ceramboides* L. Satnitz, auf Gesträuch, ziemlich selten.
- *semiflava* Küst. Ebendort, nur einmal in größerer Zahl gefangen.
- Mycetochara linearis* Ill. v. *pygmaea* Redtb. Ein Stück fand ich unter einem Stein im Walde bei St. Martin.
- Hallomenus binotatus* Quens. Im Seminarsgarten im Flug gefangen.
- Mordellistena humeralis* L. v. *axillaris* Ol. Satnitz, in Gesellschaft der Stammform auf Doldenblütlern, selten.
- Oedemera flavescens* L. Ebendort, auf schierlingartigen Gewächsen, ziemlich häufig.
- Otiorhynchus niger* F. Satnitz, unter Steinen, ziemlich selten.
- — v. *villosopunctatus* Gyllh. Ebendort, etwas häufiger.
- *perdix* Ol. Satnitz, auf Gesträuch, nicht häufig.
- *gemmatus* Scop. Ebendort, auf Gebüsch, häufig.
- *lepidopterus* F. Ebendort, nur einmal von Gesträuch geklopft.
- Phyllobius oblongus* L. v. *floricola* Herbst. Ueberall, im Frühling ziemlich häufig.
- Polydrusus ruficornis* Bousd. Satnitz, auf Gebüsch, ziemlich selten.
- Brachysomus echinatus** Bousd. Ebendort, im Moos, nicht selten.
- Sitona suturalis* Steph. v. *elegans** Gyllh. Bei Ebenthal, nur einmal gefiebt.
- Trachyploeus alternans** Gyllh. Satnitz, im Moos, ziemlich selten.
- Liosoma concinnum** Bohem. Ebendort, nur einmal gefiebt.
- Brachytemnus porcatus* Germ. Ebendort unter faulender Rinde.
- Acalles echinatus* Germ. Ebendort unter Baumrinde, nicht selten.
- Coeliodes zonatus* Germ. Satnitz, von niederen Stauden geklopft, ziemlich selten.
- *rubicundus* Herbst. Bei Schloß Zigguln auf einer Wiese gestreift.
- Rhinoncus bruchoides* Herbst v. *rufescens* Steph. Satnitz, gestreift, ziemlich selten.

- Amalus haemarrhous* Herbst. Ebendort, nur einmal mit dem Streifnetz erbeutet.
- Ceuthorrhynchus pubicollis** Gyllh. Ebendort, von meinem Bruder gefiebt.
- *asperifoliarum** Gyllh. Ebendort, auch bei St. Georgen, im Moos, nicht häufig.
- *litura** F. Satnit, nur einmal gefiebt.
- *quadridens* Panz. Ebendort, gestreift, ziemlich selten.
- *marginatus* Payk. Im Seminarz Garten gestreift.
- *assimilis** Payk. Satnit, im Moos, nicht häufig.
- Tychius polylineatus** Germ. Bei Gurnitz aus Moos gefiebt.
- Rhynchaenus tomentosus* Ol. Auf einer Wiese bei Schloß Zigguln mit dem Streifnetz gefangen.
- Mecinus pyraeter** Herbst. Satnit, in feuchtem Moos, nicht selten.
- Gymnetron beccabungae* L. v. *veronicae* Germ. Satnit, von Sumpfpflanzen gestreift, nicht häufig.
- Miarus longirostris** Gyllh. Ebendort, aus Moos gefiebt, ziemlich selten.
- Apion ononis** Kirby. Ebendort, nur einmal gefiebt.
- *vorax* Herbst. Bei Winklern gestreift, nicht häufig.
- Cimberis attelaboides* F. Diesen Käfer fieng ich im Frühling in Anzahl auf frisch gefälltem Holz beim Pulverthurm.
- Orosodacne cerasi* L. v. *lineola* Lac. Satnit, in Gesellschaft der Stammform auf *Spiraea* und *Dolde*nblüten, ziemlich selten.
- — *glabrata* Panz. Ebendort, ziemlich häufig.
- — Duftschmidti Weise. Ebendort, nicht selten.
- Donacia simplex* F. Bei Ebenthal auf Schilf und Wasserpflanzen, nicht selten.
- Plateumaris sericea* L. v. *nymphaeae* F. Ebendort, nur einmal gestreift.
- Cryptocephalus janthinus* Germ. Satnit, nur einmal gestreift.
- Melasoma aenea* L. v. *haemarrhoidalis* L. Ueberall auf Erden und Pappeln in Gesellschaft der Stammform, nicht selten.
- Hippuriphila nigritula** Gyllh. Satnit, an schattigen Waldesträndern besonders im Frühling, nicht selten.
- Chaetocnema angustula* Rosh. Ebendort, gestreift, nicht häufig.
- Longitarsus luridus* Scop. v. *4 signatus** Duft. Satnit, hin und wieder mit der Stammform vermischt, ziemlich selten.

- Longitarsus nasturtii* F. Bei Ebenthal von jumpfigen Wiesen gestreift.
- Dibolia femoralis** Redtb. Satnitz, im Moos, ziemlich selten.
- Subcoccinella* 24 *punctata* L. v. *meridionalis* Motsch. Satnitz, in Gesellschaft der Stammform, auf und unter Gesträuch, nicht selten.
- Coccinella* 10 *punctata* L. v. *lutea* Rossi. Bei St. Georgen auf Gebüsch, ziemlich selten.
- — v. 4 *punctata* L. An Waldbesrändern auf Gebüsch, nicht häufig.
- Halyzia* 22 *punctata* L. v. 20 *punctata* F. Satnitz, auf Haselnuß, in Gesellschaft der Stammform, nicht häufig.
- 14 *punctata* L. v. *conglomerata** F. Ueberall auf Gebüsch und im Moos, ziemlich häufig.
- — v. *fimbriata* Sulz. In Gesellschaft der Stammform, aber nicht häufig.

Irthümlich wurden als unserer Fauna angehörig folgende Arten aufgezählt, deren hiesiges Vorkommen bis jetzt nicht erwiesen ist:

- Bembidion atrocaeruleum* Steph.
- Platynus scitulus* Dej.
- Enochrus bicolor* Payk.
- Aleuonota rufotestacea* Kr.
- Quedius ventralis* Arag.
- Bryaxis Lefevbrei* Aubé.
- Cephennium thoracicum* Müll.
- Aeletes atomarius* Aubé.
- Athous undulatus* Deg. v. *bifasciatus* Gyllh.
- Otiorrhynchus tenebricosus* Herbst.
- Phyllobius montanus* Müll.
- Apion curvirostre* Gyllh.
- Orsodacne lineola* Panz.

Clausilien-Studien aus Kärnten.

VI. *Pirostoma lineolata* Held.

Bei unseren Studien über *Pirostoma plicatula* und *P. asphaltina* waren wir wiederholt in der Lage, Vergleichen mit *P. lineolata* H., dieser Verwandten beider, anzustellen, und schon deshalb erscheint es angezeigt, sie selbst nun in den Kreis der Betrachtungsobjecte zu

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [89](#)

Autor(en)/Author(s): Klimsch Edgar

Artikel/Article: [Die Käferwelt der Umgebung Klagenfurts, besonders jene der Satnitz \(Nachtrag und Berichtigung\) 242-247](#)