

Flora

des Peterwardeiner Grenz - Regiments Nr. 9.

Von k. k. Oberarzt Dr. Bartholomäus Godra.

(Fortsetzung und Schluss.)

- Rosmarinus officinalis* L. kultivirt, ein nie fehlender Hochzeitschmuck.
- Rubia tinctorum* L. im Grossen gebaut und im Spitals-Garten, Mitrovic.
- Rubus caesius* L. Gebüsche, Wiesen, Brachfelder, Obstgärten, Mitrovic.
- *fruticosus* L. in den Wäldern, Gebüschen.
- *Idaeus* L. Gärten, dann in Wäldern der 12. Compagnie.
- Rumex Acetosa* L. Wiesen, Obstgärten, Waldwiesen.
- *Acetosella* L. wie der Vorige.
- *crispus* L. wüste Stellen, Winkelgässchen, Schutt, Mitrovic, um die Dörfer etc.
- *Hydrolapathum* Huds. Ufer der Save, Sümpfe, Jauchengruben, Mitrovic.
- *palustris* L. feuchte Wiesen, Gräben, Sümpfe, Mitrovic, Kupinova.
- *pulcher* L. Mauern an den Häusern, Paradeplatzwiese, Mitrovic.
- *sanguineus* L. Obstgärten, Zäune, Feld- und Wiesengräben, Mitrovic, Jarak.
- *scutatus* L. wird gebaut und in Gärten kultivirt.
- Ruscus aculeatus* L. Wald bei Sisatovac.
- Ruta graveolens* L. Gärten, Weingartenränder, Mitrovic, Surčin, Ireg.
- Sagittaria sagittifolia* L. feuchte Gräben, sumpfige Orte, Mitrovic, Sümpfe, Lachen, Kupinova.
- Salix amygdalina* L. Ufer der Save.
- *fragilis* L. wie die Vorige.
- *viminalis* L. wie die Vorige.
- Salsola Kali* L. lehmige Feldgräben, in Kukurutzfeldern, Mitrovic.
- Salvia austriaca* Jacq. Wiesen, Gebüsche, in Feldgräben, Jarak, Martince.
- *officinalis* L. in Haus- und Weingärten, häufig.
- *pratensis* L. Wiesen, Wege, Obstgärten etc.
- *Sclarea* L. unbebaute Aecker, Feldgräben, Mitrovic.
- *silvestris* L. Gebüsche an der Save, extirpirte Wälder bei Kuzim Grk.
- *verticillata* L. Wiesen, Raine, Gräben, Mitrovic.
- Sambucus Ebulus* L. Brachfelder, unter dem Getreide massenhaft bei Nikince, Tovarnik, Ogar, Wege, Hutweiden, Savenfer etc.
- *nigra* L. Zäune, Hecken, in Höfen der Dörfer allgemein.
- Sanicula europaea* L. Wälder, Obrez—Martince.
- Santolina Chamae-Cyparissus* L. Obstgärten, Mitrovic und in den Ortschaften stark verbreitet.
- Saponaria officinalis* L. Weingärten, Gräben, Surčin, Gärten, Mitrovic.

- Saponaria Vaccaria* L. unter dem Getreide, Chausséen, Gärten, Mitrovic.
Satureja hortensis L. Gärten, Schutt, Mitrovic.
Scabiosa ochroleuca L. Gebüsche, Waldwiesen, Ogar.
 — *ucranica* Host. Wege, Chausséen, Feldgräben, Jarak, Ladjarak—
 Kukujevee.
Scilla bifolia L. Gebüsche an der Save, feuchte Waldränder, Bossuth
 und Klenac, Witojevee.
Scirpus Holoschoenus L. *romanus* sumpfige Wiesen, Mitrovic.
 — *lacustris* L. Wassergräben, Asanja.
 — *maritimus* L. sumpfige Wiesen, Martince gegen Kukojevee.
 — *palustris* L. Sümpfe, Lachen, Kanäle.
 — *pannonicus* L. Donau, Sumpf bei Peterwardein.
 — *radicans* Schk. feuchte sumpfige Wiesen, Mitrovic.
 — *supinus* L. sumpfige Wiesen, Martince.
 — *triqueter* L. Wassergräben, Sümpfe, Kanäle, Ufer.
Scorzonera parviflora L. lehmige Wiesen, Nikince, römischer Fried-
 hof, Mitrovic.
Scutellaria hastifolia, Wiesen, Gebüsche, Feldgräben, Mitrovic, Obst-
 gärten, überall.
Secale cereale L. wird gebaut im Grossen.
Sedum acre L. Gebüsche in Jalia, Friedhöfe, Gärten, steinige Abhänge
 bei Ireg.
 — *maximum* Pers. Abhänge am Wenac, Fruska Gora.
Sempervivum tectorum L. alte Strohdächer, alte Hütten, in jedem
 Dorfe häufig.
Senecio Jacobaea L. Gebüsche an der Strasse, Adasevce.
Serratula tinctoria L. wie die Vorige und in Wiesen, Feldgräben,
 Waldwiesen, häufig.
Seseli coloratum Ehrh. Felsenabhänge bei Peterwardein beim Brau-
 hause.
Setaria glauca PB. lästiges Unkraut der Gärten, in Kukurutzfeldern
 etc., überall.
 — *italica* PB. wird gebaut als Futtergras in der 7. und 10. Com-
 pagnie.
 — *viridis* PB. Wiesen, Wege, Aecker, Ufer.
Sherardia arvensis L. Stoppelfelder, Gebüsche an Hutweiden, Obrez.
Silene Armeria L. verwildert in Obstgärten und Gärten.
 — *inflata* L. Wiesen, Gebüsche, Zäune, Waldwiesen.
Sinapis alba L. in Haferfeldern, Aecker, Brachfelder.
 — *nigra* L. Brachfelder, Aecker, Wege, Saaten.
Sisymbrium cheiranthoides L. Wiesen, Mitrovic.
 — *Loeselii* L. Am Schutt von zerstörten Kordonshütten bei Martince
 an der Save.
 — *officinale* L. Gebüsche, Obstgärten, wüste Orte, Hutweiden, Mi-
 trovic.
 — *pannonicum* Jacq. Schutt an der Save, Mitrovic.
 — *repandum* L. Aecker, unbebaute Felder, Mitrovic.
 — *Sofia* L. Schutt, an den Häusern, um die Dörfer.

- Sisymbrium strictissimum* L. überschwemmte Gärten, wüste Orte, Mitrovic.
- Solanum Dulcamara* L. Hecken, Gebüsche, Zäune, überall.
 — *esculentum* Dun. wird kultivirt.
 — *nigrum* L. Zäune, wüste Stellen, Schutt, Obstgärten.
 — *ovigerum* Dun. wird kultivirt.
 — *Sodomaeum* L. Obstgärten, wüste Orte, Gärten, Mitrovic.
 — *tuberosum* L. auf Ackern und in Gärten kultivirt.
 — *villosum* Lam. mit *S. nigrum* in Gesellschaft.
- Solidago virga aurea* L. neu angelegte Wälder, Kuzmin.
 — *canadensis* L. Weingärten bei Kamenitz.
- Sonchus arvensis* L. unter dem Getreide (Hafer). Wiesen, Aecker, Tretplätze.
 — *oleraceus* L. Gärten, Hecken, wüste Orte, Obstgärten, Tretplätze, Schutt.
 — *palustris* L. Sümpfe bei Obrez, Obedska Bora, Kupinova etc.
- Sorbus Aucuparia* L. Wenac, Fruska Gora.
 — *domestica* L. wie der Vorige.
 — *terminalis* L. wie der Vorige.
- Sorghum cernuum* Willd. wird kultivirt, doch selten.
- Sparganium ramosum* Huds. Obedska Bora, Kupinova.
- Spartium junceum* L. in Plantage-Gärten, Mitrovic, Kupinova.
- Specularia Speculum* DC. Gebüsche, Feldgräben, Kukurutz- u. Stoppelfelder, Adasevce.
- Spinacia oleracea* L. in Gemüsegärten kultivirt in zwei Arten.
- Spiraea Filipendula* L. Wiesen, Waldwiesen, Gebüsche.
- Stachys annua* L. Aecker, Stoppelfelder, Adasevce, Mitrovic.
 — *arvensis* L. Wiesen, Gebüsche, Feldgräben, Martince, Mitrovic etc.
 — *germanica* L. Feldgräben, Wege, Chausséen.
 — *palustris* L. feuchte Gräben und Gebüsche, Adasevce.
 — *recta* L. buschige hügelige Stellen bei Surčin.
- Staphylea pinnata* L. Wenac, Fruska Gora bei Kamenitz.
- Stellaria graminea* L. Wiesen, Gebüsche an der Save, Mitrovic.
 — *Holostea* L. Gebüsche bei Kuzmin, Wälder bei Bossuth.
 — *media* L. grasige Stellen an Wegen, Obstgärten, Mitrovic.
- Succisa pratensis* Mönch. Gestrüpp am Wege bei Adasevce.
- Symphytum officinale* L. feuchte Gärten, Wiesen, Gräben.
- Syringa vulgaris* L. In Höfen, Gärten, Weingartenrändern allgemein.
- Tanacetum vulgare* L. Hecken, Gebüsche an der Save. Martince.
- Taraxacum officinale* Wig. Wiesen, Hutweiden, Obstgärten, wüste Orte, Gärten — Wege.
- Teucrium Botrys* L. sandige Gräben an der Save, Bosjevce, selten.
 — *Chamaedrys* L. buschige Orte, feuchte sandige Saveufer, an Bächen und Hutweiden. Mitrovic, Kupinova, Adasevce.
 — *Marum* L. Obstgärten, Kupinova, Gärten, Mitrovic.
 — *Scordium* L. Gräben, sumpfige Orte, Mitrovic, Kupinova.
- Thalictrum angustifolium* Jacq. Wiesen, Gebüsche, Mitrovic.

- Thalictrum collinum* Wall. Feldgräben und Gebüsche an der Strasse von Ladjarak nach Martince.
 — *flavum* L. Wiesen, Gebüsche, Feldgräben, Mitrovic, Ladjarak.
 — *minus* L. Wiesen bei Mitrovic gegen Radince.
- Thlaspi arvense* L. grasige Obstgärten, Wege, Mitrovic.
 — *perfoliatum* L. Gebüsche, Waldränder an der Save, Kuzmin, Grk.
- Thymus lanuginosus* Mill. Feldgräben, Ufer, Friedhöfe, Obstgärten und Waldwiesen.
 — *Serpyllum* L. wie der Vorige.
 — *vulgaris* wie die Vorigen.
- Tilia Europaea* L. In Wäldern an der Save gelegen, und als Alleebaum, dann in Höfen.
 — *grandifolia* Ehr. wie die Vorige.
 — *parcifolia* Ehrh. wie die Vorigen.
- Tordylium maximum* L. Feldgräben, Getreide, Ränder, Mitrovic etc.
- Torilis Anthriscus* Gmel. mit den Vorigen.
- Tragopogon pratensis* L. Wiesen, Gräben, Gebüsche, Obstgärten.
- Trifolium arvense* L. Aecker, Weiden, Obstgärten, Mitrovic etc.
 — *incarnatum* L. Waldwiese, Ogar.
 — *medium* L. buschige Stellen, Morovic.
 — *montanum* L. Wiesen an der Save, Martince.
 — *pratense* L. Wiesen, Wege, Chausséen.
 — *procumbens* L. wie das Vorige.
 — *repens* L. Weiden, Wiesen, Obstgärten, Wege.
 — *rubens* L. Waldwiesen, Grabovce.
- Triticum repens* T. lästiges Unkraut der Aecker, Gärten und Weingärten.
 — *vulgare* L. wird im Grossen gebaut.
- Tulipa Gessneriana* L. In Gärten überall.
- Turritis glabra* L. Wiesen bei Nikince.
- Tussilago Farfara* L. Wassergräben, Ufer, Hertkovce.
- Typha angustifolia* L. Obedska Bara, Kupinova.
- Ulmus campestris* L. In den Wäldern.
 — *effusa* Will. an feuchten und sumpfigen Waldgründen in Kupinova, doch nur einzeln.
- Urtica dioica* L. wüste Orte, Höfe, Gärten, an den Dorfstrassen und an Zäunen.
 — *urens* L. wie die Vorige.
- Valeriana angustifolia* Tausch, feuchte Wiesen und Gebüsche in Jalia, Mitrovic.
 — *exaltata* Mik. mit der Vorigen, und im gleichen Terrain bei Adasevce.
 — *officinalis* L. Wiesen, Gebüsche bei Sümpfen, Mitrovic und gegen Radince.
- Valerianella olitoria* Poll. Wiesen, Obstgärten, Weingartenränder, und Waldwiesen, Ogar, Mitrovic, Beska.
- Verbascum adulterinum* Koch. Unter dem Getreide, Feldgräben, Wiesen in der Leget, Mitrovic.

- Verbascum Blattaria* L. Gräben bei Ziegelöfen in der Jalia, Mitrovic.
 — *floccosum* WK. Saveufer, Mitrovic gegen Ladjarak.
 — *phoeniceum* L. Hecken, Gebüsche, Feldgräben, Friedhöfe, Adasevce.
 — *pyramidatum* MB. Gräben, wüste Stellen bei Bauschupfen, an der Save, Mitrovic.
 — *Thapsus* L. Feldgräben, unbebaute Aecker, Chausséen.
- Verbena officinalis* L. Hutweiden, Gebüsche an den Strassen, Gräben, wüste Orte, Schutt, überall.
- Veronica agrestis* L. Obstgärten in Jalia, Mitrovic.
 — *Anagallis* L. Sümpfe in Mitrovic.
 — *anagalloides* Guss. wie die Vorige und auf sumpfigen Wiesen, dann in Morästen, Sümpfen.
 — *arvensis* L. Wiesen, Weiden, Obstgärten.
 — *Chamaedris* L. Zäune, buschige, schattige Orte, Obstgärten, Mitrovic.
 — *hederaefolia* L. Aecker, Wiesen, Gärten, Weiden.
 — *latifolia* L. Gärten, Gräben, Gebüsche, Mitrovic, Martince.
 — *longifolia* L. feuchte Orte in Gebüschen, Wiesen gegen Jarak.
 — *praecox* All. Aecker, Waldwiesen, Ogar, Grobovce.
 — *scutellata* L. Gräben, Sümpfe, Sumpfwiesen, Mitrovic, Kupinova.
 — *serpyllifolia* L. feuchte Waldwiesen, Ogar.
 — *spicata* L. extirpirte und neu angelegte Wälder, Grk; Wiesengräben und Gebüsche an der Save, Martince.
- Viburnum Opulus* L. Gebüsche in Feldgräben bei Ladjarak, Wald-
 ränder, Waldgebüsche.
 — *Lantana* L. wie Voriges.
- Vicia angustifolia* Roth. Unter dem Getreide, Wiesen.
 — *bithynica* L. sandige Wiesen an der Save, Mitrovic.
 — *Cracca* L. Wiesen, Gebüsche, Martince.
 — *dumetorum* L. Gebüsche an Waldrändern, Obrez.
 — *Faba* L. von Serben überall gebaut im Grossen.
 — *grandiflora* Scop. Waldwiesen, Aecker, Ogar.
 — *hirsuta* Koch. Aecker, Gestrüpp bei Toperczer's Bienenstand, Mitrovic.
 — *pannonica* Cr. Wiesen, Gebüsche an der Save, Martince, Ladjarak.
 — *sativa* L. Wiesen und wird als Futter gebaut.
 — *segetalis* L. Aecker. Unter dem Getreide.
 — *sepium* L. Schutt, wüste Orte bei Obors, Mitrovic.
 — *serratifolia* Jacq. Feldgräben an den Strassen von Mitrovic, Jarak, Gebüsche (Leget), Mitrovic, Waldränder und Gebüsch vor Ogar, Obrez.
- Vinca major* L. Obstgärten und Gebüsche in Gärten, Salase, Mitrovic, Morovic etc.
 — *minor* L. viel häufiger als Vorige.
- Viola alba* Besser. Gebüsche an der Save. Grk, Bossuth, Jarak.
 — *arenaria* DC. mit der Vorigen, besonders an sandigen Stellen.
 — *arvensis* Mur. Wiesen an der Save, Martince, Ladjarak.
 — *canina* L. Gebüsche, Obstgärten, Salase, Waldgräben.

Viola elatior Fries. feuchte Gärten, Wiesen, Mitrovic, (Garten des Herrn Majoren Scherhauser.)

— *odorata* L. Gebüsch, Wiesen, Gestrüpp, Wälder.

— *silvestris* Kit. Wälder, Waldgebüsch.

— *tricolor* L. Aecker, unbebaute Felder, Hecken, Mitrovic.

Viscum album L. Auf Eichen in den Wäldern.

Vitis silvestris Gmel. Waldgebüsch, Wälder, sehr hoch und üppig, Wiesen und Gärten, Gebüsch an Zäunen.

— *vinifera* L. wird in verschiedenen Sorten viel kultiviert.


Xanthium strumarium L. wüste Orte, Schutt, Gräben, Mitrovic, um die Dörfer überall.

— *spinosa* L. ganze Hutweiden verdeckt es im Rgte., in Ortsgräben, Obstgärten, an Wegen, Chausséen, ein sehr lästiges Unkraut, unverwüstbar.

Xeranthemum annuum L. Um und in der Festung Peterwardein.

Zea Mays L. Wird sehr viel gebaut, da es der Bevölkerung zum grössten Theile zur Nahrung dient.

Mitrovic, im September 1871.



Skizzen

von der

Erdumseglung S. M. Fregatte „Donau“.

Von Dr. Heinrich Wawra.

(Fortsetzung.)

Die Lehnen der Berge bis zur Höhe von etwa 500' sind von einer hohen, in Klumpen geballten *Paspalum*-Art dicht bedeckt. Ziehen sich Berggrisse bis in diese Regionen hinein, so sind sie sicher mit *Aleurites*-Bäumen ausgefüllt, an deren Stamm und Aesten sich *Freycinetia arborea*, eine schlingende Pandanee in die Höhe schnell. Diese *Freycinetia* obgleich hier häufig, scheint auf den Inseln doch nur auf sehr wenige Lokalitäten beschränkt zu sein, den Namen „*arborea*“ führt sie ganz mit Unrecht, denn sie ist ein Schlinggewächs par excellence.

Wir biegen nun nach links ab um den Weiciolari zu ersteigen.

Zuerst begegnen wir dem erwähnten *Paspalum*. Die Grasdecke unten vollkommen einformig, wird höher oben von zwei Farren durchsetzt (*Sadleria* und *Cibotium*), deren dichte üppige Wedelkronen vom ellenlangen dicken Stamm bis an den Boden herabwallen. Die Basis der jüngeren Wedel, besonders von *Cibotium* ist mit einer dichten langhaarigen Filzhülle überkleidet, welche ihrer Feinheit wegen zu industriellen Zwecken Verwendung fand und früher einen nicht unbedeutenden Exportartikel der Insel bildete. *Sadleria* werden wir später noch als Baumfarren auftreten sehen. — Bei etwa 500' beginnt die Strauch- und Waldvegetation.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [022](#)

Autor(en)/Author(s): Godra Bartholomäus

Artikel/Article: [Flora des Peterwardeiner Grenz-Regiments Nr. 9. 292-297](#)