

## Impfungen Pferd

### - Influenza, Tetanus, Equines Herpesvirus –

#### **Influenza (Pferdegrippe)**

Influenza tritt in der Regel im Frühling und Sommer auf. Die Vakzinierung (Impfung) im Frühling ist zeitlich optimal. Der ganze Pferdebestand sollte geimpft werden. Pferde, welche an Wettkämpfen teilnehmen, müssen jährlich geimpft, international startende Pferde müssen halbjährlich geimpft werden.

#### **Grundimmunisierung:**

Drei Injektionen:

1. Impfung, 2. Impfung 21-90 Tage später, 3. Impfung nach weiteren 6 Monaten.

#### **Wiederholungsimpfung:**

Der Pferdesportverband schreibt eine korrekte Grundimmunisierung und eine jährliche Wiederholungsimpfung für alle Pferde und Ponies, die an Veranstaltungen teilnehmen, vor. Pferde dürfen 7 Tage nach der letzten Impfung an keiner Reitsportveranstaltung teilnehmen.

#### **Impfung beim Fohlen:**

Fohlen sollten frühestens mit 6 Monaten zum ersten mal geimpft werden. Zu diesem Zeitpunkt ist das Immunsystem des Fohlens optimal entwickelt und es gibt keine mütterlichen Antikörper mehr, die mit der Impfung interferieren.

#### **Tetanus (Starrkrampf)**

#### **Grundimmunisierung:**

wie Influenza (wird meist kombiniert)

#### **Wiederholungsimpfung:**

Es ist ausreichend, Pferde alle 2 Jahre gegen Tetanus zu impfen.

#### **Impfung beim Fohlen:**

Wie Influenza.

Als zusätzlicher Schutz zu den mütterlichen Antikörpern wird bei Fohlen ab dem 1. Lebensstag eine Behandlung mit Tetanus-Serum empfohlen.

## **Equines Herpesvirus (EHV)**

EHV1 löst beim Pferd eine Erkrankung der Atemwege aus, die mit Nasenausfluss, Husten und Fieber einhergeht. Herpesviren des Typus 4 (EHV4) können einen seuchenhaften Stutenabort auslösen. Tragende Stuten können ihre Fohlen im letzten Trächtigkeitsdrittel verlieren oder gebären lebensschwache Fohlen, die in den ersten Lebenstagen verenden.

### **Grundimmunisierung:**

Zwei Impfungen im Abstand von mind. 6 Wochen. Die 1. Impfung kann ab einem Alter von 8 Monaten erfolgen.

### **Wiederholungsimpfung:**

Nach abgeschlossener Grundimmunisierung alle 6 Monate

### **Impfung der Zuchtstute (Vorbeugung eines Aborts):**

Impfung im 5. 7. und 9. Trächtigkeitsmonat

### **Grundsätzliche Prophylaxe einer Herpesinfektion:**

- Kontakt mit kranken Tieren vermeiden
- Zuchtstuten nicht im gleichen Stall halten wie die Sportpferde
- Den ganzen Bestand impfen