

Risiko für Blutgerinnsel in den Venen oder in der Lunge

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn bei Ihnen Kurzatmigkeit oder Atemschwierigkeiten, Brustschmerzen oder Schmerzen im oberen Rücken, Schwellung im Bein oder Arm, Schmerzen oder Druckschmerzen im Bein oder Rötung bzw. Verfärbung im Bein oder Arm auftreten, da dies Anzeichen für Blutgerinnsel in den Venen sein können.

Bluttests

Ihr Arzt wird Sie bitten, vor Beginn der Behandlung mit CIBINQO® und auch während der Einnahme von CIBINQO® Blutuntersuchungen durchführen zu lassen, um unter anderem die Blutfettwerte (Cholesterin) zu überprüfen. Falls nötig, kann die Behandlung dementsprechend angepasst werden.



Empfängnisverhütung und Schwangerschaft

CIBINQO® darf NICHT während der Schwangerschaft und der Stillzeit angewendet werden.

Gebärfähige Frauen sollten während der Behandlung mit CIBINQO® und für mindestens einen Monat nach der letzten Dosis CIBINQO® eine wirksame Methode der Empfängnisverhütung anwenden. Ihr Arzt kann Sie über geeignete Methoden der Empfängnisverhütung beraten.

Informieren Sie umgehend Ihren Arzt, wenn Sie schwanger werden oder vermuten, während der Behandlung schwanger geworden zu sein.

CIBINQO®
(abrocitinib)

RMA Version 06/2023

PATIENTENKARTE

▼ **Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung**

Sicherheitsinformationen für Patienten über CIBINQO®

- Diese Karte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor und während der Behandlung mit CIBINQO® beachten sollten.
- Weitere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage, die jeder Packung von CIBINQO® beiliegt.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Ihnen eine der Informationen unklar ist.



Informationen zum Ausfüllen

Ihr Name

.....

Der Name des Arztes (der CIBINQO® verschrieben hat)

.....

Die Telefonnummer des Arztes

.....

Das Datum, an dem Sie mit CIBINQO® begonnen haben

.....

Lesen Sie die Packungsbeilage vor der Anwendung des Arzneimittels CIBINQO® sorgfältig durch. Den vollständigen und aktualisierten Text dieser Packungsbeilage ist auf der Website «[Chercher des informations sur un médicament autorisé](#)» verfügbar.

Führen Sie diese Karte mit sich und zeigen Sie sie jeder medizinischen Fachkraft, die an Ihrer medizinischen Versorgung beteiligt ist, z. B. Ihrem Apotheker oder einem Notarzt.

Was ist CIBINQO® und wofür wird es angewendet?

CIBINQO® enthält den Wirkstoff Abrocitinib. CIBINQO® gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die Januskinase-Hemmer (Inhibitoren) genannt werden und die helfen, Entzündungen zu reduzieren. CIBINQO® wirkt, indem es die Aktivität eines Enzyms im Körper namens „Januskinase“ reduziert, das an Entzündungen beteiligt ist.

CIBINQO® wird zur Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis, auch als atopisches Ekzem oder Neurodermitis bekannt, eingesetzt. Durch eine Hemmung der Aktivität der Januskinase-Enzyme lindert CIBINQO® den Juckreiz und die Entzündung der Haut. Dadurch wiederum können Schlafstörungen und andere Folgen des atopischen Ekzems, wie z. B. Angstzustände oder Depressionen, verringert und die allgemeine Lebensqualität verbessert werden.

Sie sollten über bestimmte Nebenwirkungen und über die unten aufgeführten Themen Bescheid wissen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen haben.

Risiko von Infektionen

Sprechen Sie vor und während der Behandlung mit CIBINQO® mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Symptome wie Fieber oder Wunden auftreten, wenn Sie sich müder als sonst fühlen, oder wenn Zahnprobleme auftreten, da dies Anzeichen für eine Infektion sein können.

Risiko für Herzerkrankungen

Sprechen Sie vor und während der Behandlung mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn bei Ihnen starke Schmerzen oder ein Engegefühl in der Brust (das sich auf Arme, Kiefer, Hals und Rücken ausbreiten kann), Kurzatmigkeit, kalter Schweiß, Benommenheit oder plötzlicher Schwindel auftreten, da dies Anzeichen für einen Herzinfarkt sein können.

Krebsrisiko

Bei Patienten, die CIBINQO® einnahmen, wurde nicht-melanozytärer Hautkrebs berichtet. Ihr Arzt kann empfehlen, dass Sie während der Einnahme von CIBINQO® regelmäßig Hautuntersuchungen durchführen lassen. Sollten während oder nach der Therapie neue Hautveränderungen auftreten oder bestehende Hautläsionen ihr Aussehen verändern, informieren Sie Ihren Arzt.

Impfstoffe

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie kürzlich eine Impfung (Immunisierung) erhalten haben oder eine Impfung planen – denn bestimmte Lebendimpfstoffe (Masern, Mumps und Röteln, Schluckimpfung gegen Kinderlähmung, BCG-Impfung gegen Tuberkulose, Gelbfieber, Typhus-Schluckimpfung, Windpocken, Gürtelrose) werden während oder unmittelbar vor Beginn der Anwendung von CIBINQO® nicht empfohlen.