


# Anwendung von ZYMAFLORE® ÉGIDE<sup>TDMP</sup>

## anleitung zur Beimpfung mit Nicht-Saccharomyceten zur Bioprotektion

### Ohne Rehydrierung



ZYMAFLORE® ÉGIDE<sup>TDMP</sup> 2 BIS 5 g/hL

Die weißen oder roten Trauben im Lesewagen, in der Presse oder beim Einmischen direkt beimpfen...

### Mit Rehydrierung

1 Rehydrieren



WASSER 10-Fache Gewichtsmenge der Hefen  
ZYMAFLORE® ÉGIDE<sup>TDMP</sup> 2 bis 5 g/hL

Die Nicht-Saccharomyceten mit der 10-fachen Menge ihres eigenen Gewichts an Wasser verdünnen.


2 Mischen



Das Präparat vorsichtig mischen und quellen lassen.

*Eine Schaumbildung hat nichts mit der Wirksamkeit des Gäransatzes zu tun.*

3 Beimengen



Den weißen oder roten Trauben im Lesewagen, in der Presse oder beim Einmischen zugeben.

Den Gäransatz dem Most unter gleichzeitigem Überpumpen für eine homogene Verteilung beimengen



Die Rehydrierung darf insgesamt nicht länger als 45 Minuten dauern (Schritt 1 + 2)