

BULLETIN ZOOLOGISCH MUSEUM



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Vol. 4 No. 17 28.VIII.1975

VIER NEUE MIRIDEN (INSECTA, HEMIPTERA, HETEROPTERA) AUS DEM MITTELMEERGEBIETE

Ed. WAGNER

ABSTRACT

Description of four new Miridae: *Phytocoris* (*Ktenocoris*) *zebra* n. sp. from Corsica, *Myrmecophyes* *latus* n. sp. from Jugoslavia, *Orthotylus* (*Melanotrichus*) *intricatus* n. sp. and *O. (M.) lesbicus* n. sp., both from the Greek island Lesbos.

EINLEITUNG

Durch Herrn J.P. Duffels und Herrn W.H. Gravestein, verbunden am Zoologischen Museum Amsterdam erhielt ich abermals einiges Mediterrane Miridenmaterial zur Bestimmung. Ich danke auch an dieser Stelle ihnen verbindlichst dafür. Das Material enthält einige interessante, neue Arten, die weiter unten beschrieben werden.

Phytocoris (*Ktenocoris*) *zebra* n. sp.

Material.- 5 ♂♂ und 1 ♀ von der Insel Korsika: Vizzavona, 850-950 m, 4.-10.8.1971, 2 ♂♂ 1 ♀; 1100-1200 m, 6.8.1971, 1 ♂; ebenda, 12.8.1971, 1 ♂; 1250-1500 m, 17.8.1971, 1 ♂; leg. A.C. und W.N. Ellis.

Holotypus und Paratypen im Zoologischen Museum Amsterdam, Paratypen auch in meiner Sammlung.

Schlank, das ♂ makropter und 4 ×, das ♀ pseudo-brachypter und 4,2 × so lang wie die Pronotumbreite. Die Art kommt in 2 Färbungsvarianten vor. Die eine ist überwiegend rot gefärbt, vor allem die dunkle Zeichnung ist stets rot. Die andere ist hell gelblichgrau und ihre Zeichnung ist bräunlich bis schwärzlich. Einige Teile der Zeichnung sind bei beiden Formen schwarz: Die Behaarung besteht aus anliegenden, krausen, weisslichen Haaren und halbaufgerichteten, kräftigeren, glatten schwarzen Haaren.

Kopf (Fig. 1b) mit zebraartiger Querstreifung, die grau oder rot und zuweilen nur schattenartig zu erkennen ist. Scheitel am Hinterrande mit 3 kleinen runden Flecken, davor eine Querbinde, die in der Mitte unterbrochen ist. Stirn mit 6 Querstreifen, die ebenfalls in der Mitte unterbrochen sind und nicht bis zum Augenrand reichen. Unterer