

Rheuma Ectroplex®

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Muskel / Gelenke

Homöopathisches Komplexmittel (Potenzen)

Bei rheumatischen Erkrankungen

Wirkstoffe (1 ml enthält):		Monographien	Ergänzende Symptomauswahl
Acidum silicicum Dil. D8 aquos	0,01 ml	Chron. Entzündungen und Gewebeschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke	Gelenkschmerzen, Steifigkeit der Glieder
Bryonia Dil. D3	0,01 ml	Rheumatismus	Gelenke heiß, rot und geschwollen, Myalgien
Gnaphalium polycephalum (HAB 34) Dil. D2 (HAB, V3a)	0,01 ml	Rheumatismus, Nervenschmerzen	Rheuma in den Extremitäten, Fußkrämpfe, Ischiasschmerz
Ledum palustre Dil. D3	0,01 ml	Gicht und Gelenkrheumatismus	Schmerzen der kleinen Gelenke, schmerzhafte Tophi
Toxicodendron quercifolium Dil. D4	0,01 ml	Rheumatische Schmerzen in Knochen, Gelenken, Sehnen und Muskeln	Neuralgische Schmerzen mit Kribbeln und Taubheitsgefühlen
Viscum album Dil. D4	0,01 ml	Verschleißkrankheiten der Gelenke	Hüftnerven schmerzhaft, Rückensteifigkeit

Die Bestandteile Nr. 2, 4, 5 und 6 werden über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.

Darreichungsform	Flüssige Verdünnung zur i.m., i.v., s.c. Injektion
Anwendungsgebiete	Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Rheumatismus.
Gegenanzeigen	Überempfindlichkeit gegen Korbblütler und Giftsumachgewächse; Kinder unter 12 Jahren.
Vorsichtsmaßnahmen	Bei Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.
Nebenwirkungen	In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen und plötzlicher Blutdruckabfall auftreten. Bei empfindlichen Personen kann es zu Blasen- und Pustelbildung an Gesicht, Hals und Armen kommen.
Wechselwirkungen	Keine bekannt.
Dosierung	Soweit nicht anders verordnet, parenteral 1 x täglich je 1-2 ml subkutan, intramuskulär oder langsam intravenös injizieren. Bei Verwendung nur eines Teils des Ampulleninhalts ist der restliche Ampulleninhalt zu verwerfen.
Packungsgrößen	5, 50 und 100 Ampullen zu 2 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion