

Naranotox®

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Echinacea Dil. D 1 0,15 ml, Ferrum phosphoricum Dil. D 6 aquos. (HAB 1, V. 8b) 0,50 ml.

Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.

Flüssige Verdünnung zur Injektion

10 (bzw. 50, 100 oder 300 Ampullen) zu 2 ml

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.

Homöopathisches Laboratorium

A. Pflüger GmbH & Co. KG

Bielefelder Str. 17

33378 Rheda-Wiedenbrück

Anwendungsgebiete: Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen der Atemorgane.

Hinweis: "Dieses Arzneimittel dient der unterstützenden Behandlung und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Medikamente (z.B. Antibiotika). Bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39°C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden."

Gegenanzeigen: Chronisch progrediente Entzündungen, Leukämie, Diabetes mellitus, Überempfindlichkeit gegen Korbblüter. Nicht anwenden bei Säuglingen, Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblüter. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen oder progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose und anderen Autoimmunerkrankungen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten ?

Wie alle Arzneimittel sollte Naranotox in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen ?

Zur Anwendung dieses Arzneimittles bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen: Nicht bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierung: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen 1 Ampulle bis zu 3 mal täglich intravenös, intramuskulär oder subcutan bzw. bei chronischen Verlaufsformen 1 Ampulle pro Tag intravenös, intramuskulär oder subcutan injizieren.

Dauer der Anwendung: Naranotox sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen eingenommen werden.

Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerungen). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

12.98



PFLÜGER
HOMÖOPATHISCHE
ARZNEIMITTEL

A. Pflüger GmbH & Co. KG
Homöopathisches Laboratorium
Bielefelder Straße 17

D - 33378 Rheda - Wiedenbrück