

Mathematik

Typus C

Bemerkungen:

Zeit: Drei Stunden.

Jede vollständig gelöste Aufgabe wird mit maximal 10 Punkten bewertet. Für 40 Punkte wird die Note 6 erteilt.

Hilfsmittel: DMK Formeln und Tafeln, Taschenrechner TI-82 bzw. TI-85 (graphikfähig).

1. Durch $k_a: (x + y)^4 = a \cdot x^3$ ist eine Kurvenschar durch den Ursprung mit dem Scharparameter $a > 0$ gegeben [Schooten-Kurve, nach Frans van Schooten (1615-1660), bearbeitet durch Christian Huygens (1629-1695)].
- Notiere die zur Kurve k_a gehörenden reellen Funktionen $y_1 = f_1(x)$ und $y_2 = f_2(x)$ und bestimme von diesen Funktionen Definitionsbereich, Nullstellen, Hochpunkt H und Kurventangenten im Ursprung in Abhängigkeit von a .
 - Setze nun $a = 4$. Die vertikale Gerade $x = t$ schneidet die Kurve k_4 in den beiden Punkten T_1 und T_2 . Zeige, dass sich die beiden Kurventangenten t_1 und t_2 durch T_1 und T_2 immer auf der Winkelhalbierenden des II. und IV. Quadranten schneiden; bestimme die Koordinaten des Schnittpunktes S der beiden Tangenten.
 - Zeichne die algebraische Kurve k_a für $a = 4$ mit den Tangenten durch die Punkte T_1 und $T_2 \neq T_1$, wenn die Abszisse dieser Punkte gleich einer Nullstelle von k_4 ist.
 - Bestimme den Inhalt der von der Kurve k_a und der vertikalen Geraden durch die positive Nullstelle eingeschlossenen Fläche in Abhängigkeit von a .

2. Gegeben sind der Punkt $P(12/1/1)$ sowie die zwei Geraden $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und

m: Parallele zur z-Achse durch den Punkt $(1/0/0)$.

- P und g bestimmen eine Ebene E. Gib ihre Koordinatengleichung an.
- E soll Tangentialebene einer Kugel k mit Radius 3 sein, deren Mittelpunkt M auf der Geraden m liegt und minimale z-Koordinate hat.
Wie heisst die Gleichung von k?
- Bestimme die Gleichung derjenigen Kugeltangente h an k, die in E liegt und die z-Achse schneidet.
Wie gross ist der Winkel zwischen den beiden Geraden g und h?
- Wie lautet die Gleichung derjenigen andern Tangentialebene Δ an k, die die Gerade g enthält?

3. In einem Wettermodell gibt es Regentage (R-Tage), bewölkte Tage (B-Tage) und Sonnentage (S-Tage). Die Wahrscheinlichkeit, dass auf einen R-Tag ein B-Tag folgt (oder umgekehrt), sei a . Die Wahrscheinlichkeit, dass auf einen B-Tag ein S-Tag folgt (oder umgekehrt), sei ebenfalls a . Die Wahrscheinlichkeit, dass auf einen R-Tag ein S-Tag folgt (oder umgekehrt), sei $\frac{a}{2}$. Nach einem **Regentag** wird die Periode der n darauffolgenden Tage betrachtet.

- a) Wie gross sind die Wahrscheinlichkeiten der drei Ereignisse
 a1) auf einen R-Tag folgt ein R-Tag? a2) auf einen S-Tag folgt ein S-Tag?
 a3) auf einen B-Tag folgt ein B-Tag?
 Leite daraus eine Bedingung für a ab.
- b) Sei $a = 0.2$. Wie lange muss die Periode n mindestens sein, damit mit Wahrscheinlichkeit kleiner als 10% lauter Regentage auftreten?
- c) Berechne in Abhängigkeit von n und a die W'keit, dass jeder der n Tage ein Sonnentag ist. Wie gross muss a (in Abhängigkeit von n) gewählt werden, damit diese W'keit maximal ist?
- d) Sei nun $n = 2$. Die Zufallsvariable X sei die Anzahl der Sonnentage in dieser Periode. Berechne für allgemeines a den Erwartungswert $E(X)$. Für welches a wird $E(X)$ maximal?

4. Löse die beiden unabhängigen Teilaufgaben.

- a) Gegeben ist die Affinität f mit den Gleichungen $f: x' = ax + b, y' = cy$ sowie die Kurve mit Gleichung $y = g(x) = \frac{1}{2} e^{-\frac{(x-1)^2}{8}}$. Bestimme zuerst die reellen Parameter $a > 0, b$ und c derart, dass der Graph von g unter der Affinität f auf die Kurve mit Gleichung $y = e^{-\frac{x^2}{2}}$ abgebildet wird. Gib nun die Abbildungsdeterminante von f an, entscheide, ob f eine perspektive Affinität ist und ob f Fixgeraden besitzt.

- b) Die Funktion mit Gleichung $f: x \rightarrow y = \frac{x}{1+x^2}$ lässt sich für gewisse x -Werte als Grenzwert einer geometrischen Reihe mit dem Anfangsglied x und dem Quotienten $q = -x^2$ auffassen. Bricht man die geometrische Reihe nach n Gliedern ab, so stellt die berechnete Summe $P_n(x)$ eine Approximation für die Funktion f dar.

Bestimme durch Integration von $P_4(x) \cdot \ln(x)$ eine Näherung für das uneigentliche Integral $\int_0^1 \frac{x \cdot \ln(x)}{1+x^2} dx$.

5. Gegeben ist die komplexe Funktion $z \rightarrow w = f(z) = \frac{z}{1-i \cdot z}$.

- a) Bestimme alle Fixpunkte dieser Abbildung.
 b) Bilde den Einheitskreis und die reelle Achse mit f ab.
 c) Es sei $f^1(z) = f(z), f^2(z) = f(f(z))$ und $f^{n+1}(z) = f(f^n(z))$ die Verkettung(en) der Funktion f mit sich selbst. Berechne $f^n(z)$ für $n = 2, 3$ und 4 ; stelle eine Vermutung für beliebiges n auf und beweise diese mit vollständiger Induktion.
 d) Bestimme für beliebiges z den Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(z)$.