



Klausurenkurs zum Staatsexamen (WS 2016/17): Lineare Algebra und analytische Geometrie 4

4.1 (Frühjahr 2007, Thema 1, Aufgabe 1)

Zeigen Sie, dass die beiden folgenden Unterräume des \mathbb{R}^3 übereinstimmen:

$$U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad V = \left\langle \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

4.2 (Frühjahr 2001, Thema 2, Aufgabe 1)

Gegeben seien die folgenden Unterräume des \mathbb{R}^3 :

$$U := \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad V := \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Bestimmen Sie eine Basis von $U \cap V$.

4.3 (Frühjahr 2000, Thema 2, Aufgabe 1)

Gegeben seien die beiden Unterräume

$$U := \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad V := \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

im \mathbb{R}^3 . Bestimmen Sie eine Basis des Unterraums $U \cap V$.

4.4 (Frühjahr 2011, Thema 2, Aufgabe 1)

Es sei $V \subset \mathbb{R}^4$ der von den Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

erzeugte Unterraum. Zeigen Sie, dass V den Vektor

$$v = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

enthält und bestimmen Sie die Dimension von V .

4.5 (Frühjahr 2000, Thema 3, Aufgabe 1)

Gegeben seien die Vektoren

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

- Zeigen Sie, dass u , v , w und x in einem Untervektorraum $U \subseteq \mathbb{R}^4$, $U \neq \mathbb{R}^4$, enthalten sind.
- Geben Sie eine lineare Gleichung an, deren Lösungsmenge der Untervektorraum U ist.

4.6 (Herbst 2013, Thema 1, Aufgabe 5)

Es sei $a \in \mathbb{R}$ gegeben. Weiter sei U_a der von den folgenden Vektoren aufgespannte Untervektorraum von \mathbb{R}^5 :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Bestimmen Sie in Abhängigkeit von a eine Basis von U_a .
- Ergänzen Sie jeweils die Basis von U_a aus a) zu einer Basis von \mathbb{R}^5 .

4.7 (Herbst 2002, Thema 1, Aufgabe 2)

Gegeben seien die Vektoren $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ des \mathbb{R}^4 .

U sei der von u_1 , u_2 und u_3 aufgespannte Unterraum des \mathbb{R}^4 . $W \subset \mathbb{R}^4$ sei die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems

$$\begin{array}{rcl} x_2 - x_3 + 7x_4 & = & 0 \\ x_1 - 2x_2 - 4x_4 & = & 0 \end{array}$$

- Bestimmen Sie eine Basis B_U von U und eine Basis B_W von W .
- Bestimmen Sie die Dimension von $U \cap W$ und von $U + W$.
- Ergänzen Sie B_U zu einer Basis von $U + W$.

4.8 (Frühjahr 2011, Thema 1, Aufgabe 5)

Im Vektorraum der reellen Polynome seien die folgenden Teilmengen gegeben:

$$\begin{aligned} U_1 &= \{P : P(x) = ax^2 + bx + c \text{ mit } a, b, c \in \mathbb{R}\}, \\ U_2 &= \{P : P(x) = ax^2 + bx \text{ mit } a, b \in \mathbb{R}\}, \\ U_3 &= \{P : P(x) \equiv 0 \text{ oder } \text{Grad}(P) \geq 2\}, \\ U_4 &= \{P : P(x) = ax^2 + bx + c \text{ mit } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ und } c \neq 0\}. \end{aligned}$$

Überprüfen Sie, welche dieser Teilmengen einen linearen Unterraum bilden.

4.9 (Herbst 2009, Thema 2, Aufgabe 2)

Es sei V der \mathbb{R} -Vektorraum aller reellen Polynome vom Grad ≤ 2 . Die Teilmenge

$$U := \{p \in V \mid p(x) = p(1-x)\}$$

ist ein linearer Unterraum von V .

- Bestimmen Sie eine Basis von U .
- Ergänzen Sie die Basis von U aus a) zu einer Basis von V .

4.10 (Frühjahr 2015, Thema 1, Aufgabe 2)

Sei $P_3 = \{p = a_0 + a_1X + a_2X^2 + a_3X^3 : a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$ der reelle Vektorraum aller reellen Polynome vom Grad höchstens 3.

- Zeigen Sie: $U = \{p \in P_3 : p(1) = 0\}$ ist ein Untervektorraum von P_3 .
- Zeigen Sie: $\mathcal{B} = \{X - 1, X^2 - 1, X^3 - 1\}$ ist eine Basis von U .
- Geben Sie die Abbildungsvorschrift des durch die (angeordnete) Basis \mathcal{B} aus Teil b) gegebenen Vektorraumisomorphismus $\varphi_{\mathcal{B}} : \mathbb{R}^3 \rightarrow U$ an.

4.11 (Herbst 2015, Thema 2, Aufgabe 1)

Im \mathbb{R} -Vektorraum V aller reellen Polynome p mit $\text{Grad}(p) \leq 3$ betrachte man den von

$$p_1 = X^3 - X^2, \quad p_2 = X^3 - X, \quad p_3 = X^2 - X \quad \text{und} \quad p_4 = X^3 - 1$$

erzeugten Untervektorraum U von V .

- Man zeige: U ist die Menge aller Polynome $p \in V$, die eine Nullstelle bei 1 besitzen.
- Man wähle aus p_1, p_2, p_3, p_4 eine Basis von U aus und ergänze diese zu einer Basis von V .

4.12 (Herbst 2011, Thema 1, Aufgabe 1)

Im \mathbb{R} -Vektorraum V aller Polynome mit reellen Koeffizienten seien

$$u_1 = X^3 + X^2, \quad u_2 = X^2 + X \quad \text{und} \quad u_3 = X + 1$$

sowie

$$w_1 = X^3 - X^2 + X \quad \text{und} \quad w_2 = X^2 - X + 1$$

gegeben; ferner seien $U = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ und $W = \langle w_1, w_2 \rangle$ die von u_1, u_2, u_3 bzw. von w_1, w_2 erzeugten Unterräume von V . Man bestimme eine Basis des Unterraums $U \cap W$.

4.13 (Herbst 2005, Thema 2, Aufgabe 3)

Im reellen Vektorraum $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ sei

$$U = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid A^T = A \text{ und } \text{Spur}(A) = 0\}.$$

- Zeigen Sie, dass U ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ ist.
- Bestimmen Sie die Dimension von U .

c) Zeigen Sie, dass

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

in U liegen und linear unabhängig sind. Ergänzen Sie $\{A_1, A_2\}$ zu einer Basis von U .

4.14 (*Herbst 2008, Thema 1, Aufgabe 2*)

- Es seien W_1 und W_2 Untervektorräume eines reellen Vektorraums V . Wie lautet die Dimensionsformel für Summe $W_1 + W_2$ und Durchschnitt $W_1 \cap W_2$?
- Welche Dimension kann $W_1 \cap W_2$ haben, wenn $\dim W_1 = \dim W_2 = 3$ und $V = \mathbb{R}^5$ ist? Belegen Sie jeden möglichen Wert von $\dim(W_1 \cap W_2)$ durch ein Beispiel.

4.15 (*Frühjahr 2003, Thema 1, Aufgabe 1*)

Welche Dimension kann der Durchschnitt eines dreidimensionalen und eines vierdimensionalen Untervektorraums in einem sechsdimensionalen Vektorraum haben?

4.16 (*Herbst 2009, Thema 3, Aufgabe 2*)

Es seien v und w linear unabhängige Vektoren in einem \mathbb{R} -Vektorraum V , sowie α und β zwei reelle Zahlen. Zeigen Sie: Die Vektoren $x = \alpha v + \beta w$ und $y = \beta v + \alpha w$ sind genau dann linear abhängig, wenn $\alpha = \beta$ oder $\alpha = -\beta$.

4.17 (*Frühjahr 1999, Thema 1, Aufgabe 1*)

Es sei $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ eine Basis des Vektorraums V über dem Körper \mathbb{R} . Weiter seien Vektoren $a_i \in V$ gegeben durch

$$a_1 = b_1 + \beta_1 \cdot b_3, \quad a_2 = b_2 + \beta_2 \cdot b_4, \quad a_3 = \beta_3 \cdot b_1 + b_3, \quad a_4 = \beta_4 \cdot b_2 + b_4,$$

wobei $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ und β_4 feste reelle Zahlen sind. Zeigen Sie, dass $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ genau dann eine Basis von V ist, wenn

$$(1 - \beta_1 \beta_3)(1 - \beta_2 \beta_4) \neq 0.$$

4.18 (*Frühjahr 2009, Thema 2, Aufgabe 1*)

Es sei $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ eine Basis des \mathbb{R} -Vektorraums V . Ferner seien

$$a_1 = 2b_1 - b_2, \quad a_2 = b_2 + b_3 + b_4, \quad a_3 = b_3 - b_4$$

und $U = \text{span}\{a_1, a_2, a_3\}$ der von a_1, a_2, a_3 aufgespannte Unterraum.

- Zeigen Sie, dass $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ eine Basis von U ist.
- Zeigen Sie, dass $x = 6b_1 - 5b_2 - 4b_4$ in U liegt und bestimmen Sie die Koordinaten von x bezüglich A .
- Ergänzen Sie A zu einer Basis von V .

4.19 (Frühjahr 2006, Thema 3, Aufgabe 2)

Es seien v_1, v_2, v_3, v_4 vier linear unabhängige Vektoren in einem \mathbb{R} -Vektorraum. Weiter sei U der von

$$u_1 := v_1 + v_2, \quad u_2 := v_2 + v_3, \quad u_3 := v_3 + v_4$$

aufgespannte Untervektorraum und W der von

$$w_1 := v_1 - v_2, \quad w_2 := v_2 - v_3$$

aufgespannte Untervektorraum. Bestimmen Sie die Dimensionen der Untervektorräume $U, W, U \cap W$ und geben Sie eine Basis von $U \cap W$ an.

4.20 (Frühjahr 2002, Thema 3, Aufgabe 1)

Es seien a, b, c und d linear unabhängige Vektoren in einem reellen Vektorraum. Man bestimme die Dimension des von den Vektoren

$$v_1 = a + b + c + d, \quad v_2 = b + c, \quad v_3 = c + d, \quad v_4 = a + b$$

aufgespannten Unterraums.

4.21 (Herbst 2000, Thema 1, Aufgabe 1)

V sei ein reeller Vektorraum und $B = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ eine Basis von V . Der Unterraum $U \subset V$ werde von den Vektoren u_1, u_2 und u_3 aufgespannt, der Unterraum $W \subset V$ von w_1 und w_2 , wobei

$$u_1 = v_1 + v_2 - v_3 - v_4, \quad u_2 = 2v_2 + 3v_3, \quad u_3 = -v_1 + v_2 + 4v_4,$$

$$w_1 = 2v_2 + v_3 + v_4, \quad w_2 = -2v_1 + 3v_3 + 2v_4.$$

- Untersuchen Sie, ob $x = v_1 + v_2 + v_3 + v_4$ in U liegt.
- Bestimmen Sie eine Basis von $U \cap W$.

4.22 (Frühjahr 2000, Thema 1, Aufgabe 1)

Seien a, b und c Vektoren eines \mathbb{R} -Vektorraums V . Zeigen Sie:

- Die Vektoren $v_1 = a + b + c, v_2 = a + 2b + 3c, v_3 = 2a + 3b + c$ und $v_4 = 3a + b + 2c$ sind linear abhängig.
- Sind $\{a, b, c\}$ eine Basis von V , so sind die Vektoren v_1, v_2, v_3 linear unabhängig.

4.23 (Herbst 2007, Thema 1, Aufgabe 5)

Es sei M eine reelle $n \times n$ -Matrix mit $M^2 = M$. Weiter sei $U \subset \mathbb{R}^n$ der Lösungsraum des linearen Gleichungssystems $M \cdot x = 0$ und $S \subset \mathbb{R}^n$ der von den Spalten der Matrix M erzeugte Untervektorraum. Zeigen Sie:

- Für alle $v \in \mathbb{R}^n$ ist $v - M \cdot v \in U$,
- $\mathbb{R}^n = U \oplus S$ (direkte Summe).

4.24 (Frühjahr 2013, Thema 3, Aufgabe 1)

a) Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 3$ sei die Matrix $A = (a_{ij})_{ij} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{für } i = j, \\ 1, & \text{für } i = j + 1, \\ a, & \text{für } i = 1 \text{ und } j = n, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

mit einem Parameter $a \in \mathbb{R}$ gegeben; zu betrachten ist also

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & a \\ 1 & 1 & 0 & & & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Man zeige $\det(A) = 1 + (-1)^{n+1} a$ etwa unter Verwendung des Laplace-schen Determinantenentwicklungssatzes.

b) Sei V ein \mathbb{R} -Vektorraum mit $\dim(V) = n \geq 3$ sowie b_1, \dots, b_n eine Basis von V ; ferner werden die Vektoren $v_j = b_j + b_{j+1}$ für $j \in \{1, \dots, n-1\}$, also

$$v_1 = b_1 + b_2, \dots, v_{n-1} = b_{n-1} + b_n,$$

sowie $v_n = b_n + b_1$ betrachtet. Man zeige etwa mit Hilfe von a), dass

- die Vektoren v_1, \dots, v_{n-1} linear unabhängig sind,
- die Vektoren v_1, \dots, v_{n-1}, v_n genau dann eine Basis von V sind, wenn n ungerade ist.

4.25 (Herbst 2014, Thema 2, Aufgabe 1)

Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ seien die $n-1$ Vektoren

$$s_1, \dots, s_{n-1} \in \mathbb{R}^n$$

fest gewählt; es bezeichne

$$U = \langle s_1, \dots, s_{n-1} \rangle \subseteq \mathbb{R}^n$$

den von s_1, \dots, s_{n-1} erzeugten Untervektorraum von \mathbb{R}^n . Ferner betrachte man die lineare Abbildung

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \det(s_1, \dots, s_{n-1}, x);$$

die Linearität von f ergibt sich direkt aus den Eigenschaften der Determinante und muss hier nicht nachgeprüft werden.

- Man zeige $U \subseteq \text{Kern}(f)$.
- Man bestimme $\dim \text{Kern}(f)$ in Abhängigkeit von $\dim(U)$.