

Dok.Typ	Dok.Referenznummer	Rev.-Stand	Erstellung / Überarbeitung	Inhaltliche / Fachliche Prüfung
FO	13100000-0007	Rev 00	Daniela Kambeck	Michael Vogt
QEP 1.3.1	Ziel 1, (Kernziel), Patienteninformation			

Diabetiker Koloskopievorbereitung

Veröffentlichung / Freigabe
Michael Vogt

Kolovorbereitung bei Diabetikern Wie behandel ich meinen Zucker bei der Vorbereitung und Untersuchung.

A) bei Mischinsulin:

Am Vortag: morgens normal spritzen.
abends reduzieren um 30-50%.

B) Altinsulin:

Am Vortag: zu den Mahlzeiten 50% weniger spritzen
da Sie weniger essen und auch durch die Abführmaßnahmen
weniger aufnehmen können

Untersuchungstag: bitte kein Kurzzeitinsulin (Essinsulin) spritzen,
da Sie ja nüchtern bleiben müssen. Es darf aber nach den üblichen
Regeln korrigiert werden.

C) Verzögerungsinsulin:

An beiden Tagen: darf morgens und abends in normaler Dosis gespritzt werden.

D) Orale Antidiabetika (tablettspflichtige Diabetiker)

Vortag: morgens nur halbe Dosis

Untersuchungstag: Keine Tablette mehr nehmen.

E) Bitte mitbringen, sofern vorhanden:

BZ-Messgerät
BZ-Stix, Lanzetten, Stechhilfe
Traubenzucker
Etwas zu Essen (danach)
Insulin-Pen bzw. Insulinspritze

Anhang: Korrekturschema mit Altinsulin vor der Untersuchung:

Blutzucker:	60-100 mg/dL:	1 BE essen, kein Insulin geben
	100-150 :	nüchtern bleiben, kein Altinsulin
	150-200 :	2 IE Altinsulin
	200-250 :	4 IE Altinsulin
	250-300 :	6 IE Altinsulin
	300-350 :	8 IE Altinsulin