

Replagal

[Agalsidase alfa]



Leitfaden für die sichere Anwendung - Patienten* und Betreuungspersonen

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsinformation zu Replagal

Dieser Leitfaden wurde als verpflichtender Teil der Zulassung dieses Arzneimittels erstellt und mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) abgestimmt. Dieser soll als zusätzliche risikominimierende Maßnahme sicherstellen, dass Patienten und Betreuungspersonen mit den Besonderheiten der Anwendung von Agalsidase alfa vertraut sind und dass dadurch mögliche Risiken bei der Selbstverabreichung reduziert werden.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



Inhalt

01 Vorbereitung für die Selbstverabreichung von Agalsidase alfa	4	05 Was zu tun ist, wenn bei der Behandlung mit Agalsidase alfa Nebenwirkungen oder Probleme auftreten	10
Was Sie benötigen	4	Mögliche Nebenwirkungen von Agalsidase alfa	10
Vor Beginn	5	Probleme, die bei der Selbstverabreichung von Agalsidase alfa auftreten könnten	10
Bereiten Sie den Arbeitsbereich vor	5	06 Meldung von Nebenwirkungen	11
Vorbereitung der Infusionsstelle (bei Anwendung mit und ohne Portkatheter)	5	07 Sicherheits- und Notfallplan	12
02 Vorbereitung der Infusion	6	08 Infusionstagebuch	15
Bereiten Sie die Lösung vor	6	Ihre Dosis	17
Schließen Sie den Infusionsschlauch an	7	Einträge im Infusionstagebuch	18
03 Verabreichung der Agalsidase alfa-Infusion	8		
04 Nach der Infusion	9		
Letzte Schritte nach der Infusion	9		

01

Vorbereitung für die Selbstverabreichung von Agalsidase alfa

Vorbereitung für die Selbstverabreichung von Agalsidase alfa

Was Sie benötigen

Es werden u.a. die folgenden medizinischen Produkte und Geräte für eine Heiminfusion benötigt.

In den Kästchen links kann Ihr behandelnder Arzt jeweils ankreuzen, welche dieser Materialien Sie benötigen.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agalsidase alfa Durchstechflasche(n) | <input type="checkbox"/> 10-ml-Spritzen |
| <input type="checkbox"/> Medizinisches Tablett | <input type="checkbox"/> Filter |
| <input type="checkbox"/> Verbandset/sterile Abdeckung | <input type="checkbox"/> Infusionsbeutel mit 0,9%iger Natriumchloridlösung (100 ml) |
| <input type="checkbox"/> Alkoholtupfer | <input type="checkbox"/> Spülbeutel mit 0,9%iger Natriumchloridlösung |
| <input type="checkbox"/> 21G Kanülen | <input type="checkbox"/> Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände |
| <input type="checkbox"/> Infusionsset bestehend aus Infusionsnadel/
Infusionskanüle (mit Kanülenverlängerung) und
Infusionsschlauch
ODER | <input type="checkbox"/> Infusionspumpe (optional) - BITTE BEACHTEN SIE:
Wenn Sie eine Infusionspumpe verwenden, befolgen
Sie bitte die Anweisungen, die Sie von Ihrem Arzt/
dem medizinischen Fachpersonal erhalten haben. |
| <input type="checkbox"/> Nadel des Infusionsports (Portkatheternadel) | |
| <input type="checkbox"/> Fixierpflaster | |
| <input type="checkbox"/> Wattebäusche/Mulltupfer | |
| <input type="checkbox"/> Pflaster | |
| <input type="checkbox"/> Infusionsständer | |
| <input type="checkbox"/> Einweghandschuhe | |
| <input type="checkbox"/> Venenstauer | |
| <input type="checkbox"/> Nadelfreier Stopfen | |

Hinweise:

Vor Beginn

- Lagern Sie das Arzneimittel im Kühlschrank (2 °C – 8 °C)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Anzahl von Agalsidase alfa-Durchstechflaschen haben.
- Infundieren Sie das Medikament NICHT, wenn:
 - **das Verfalldatum überschritten ist (Chargennummer (Lot) und Verfalldatum (EXP) befinden sich auf der Rückseite der Durchstechflasche.**
 - **die Lösung verfärbt ist oder sichtbare Partikel enthält und/oder die Schutzkappen der Durchstechflaschen fehlen oder beschädigt sind.**
- Nehmen Sie die Durchstechflaschen rechtzeitig aus dem Kühlschrank, damit sich das Arzneimittel der Raumtemperatur anpassen kann.
- Erwärmen Sie die Lösung NICHT in der Mikrowelle oder indem Sie die Durchstechflaschen in heißes Wasser stellen oder auf andere Weise Wärme zuführen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Infusion nicht allein sind, sondern eine erwachsene Person (Betreuungsperson) bei Ihnen ist, die Sie bei der Infusion unterstützen kann.

Bereiten Sie den Arbeitsbereich vor

- Bereiten Sie eine saubere, ebene Oberfläche vor und stellen Sie alle Materialien zusammen, die Sie für die Infusion benötigen.
- Halten Sie Ihre Ausrüstung für Notfälle (z.B. Adrenalin-Pen) bereit.
- Waschen Sie Ihre Hände 30 Sekunden lang und trocknen Sie Ihre Hände ab.
- Ziehen Sie gemäß Ihrer Schulung Einmalhandschuhe an.

Vorbereitung der Infusionsstelle (bei Anwendung mit und ohne Portkatheter)

Eine ausführliche Schulung zur Vorbereitung der Infusionsstelle erfolgt durch medizinisches Fachpersonal. Ein ordnungsgemäßer Zugang ist sehr wichtig. Bei Bedarf bitten Sie Ihre Betreuungsperson Ihnen bei der Vorbereitung der Infusionsstelle zu helfen.


Eine ausführliche Schulung zur Vorbereitung des Portkatheters für die Infusion erfolgt durch medizinisches Fachpersonal.

Hinweise:


Vorbereitung der Infusion

Bereiten Sie die Lösung vor

Bei Bedarf bitten Sie Ihre Betreuungsperson Ihnen bei der Vorbereitung der Infusion zu helfen.




1 Nehmen Sie den Infusionsbeutel (100 ml 0,9%iges Natriumchlorid [Kochsalzlösung]) aus der Umverpackung und hängen Sie den Beutel an den Infusionsständer.




2 Bei jeder Agalsidase alfa-Durchstechflasche müssen Sie:


- die Schutzkappe abnehmen,
- den Gummistopfen mit Desinfektionsmittel besprühen
- ihn 30 Sekunden lang trocknen lassen.



3 Stecken Sie eine 21G Kanüle auf eine sterile Spritze. Ziehen Sie Agalsidase alfa aus der Durchstechflasche langsam in die Spritze auf, um Schaumbildung zu vermeiden. Berühren Sie weder den Gummistopfen noch die Kanüle. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Durchstechflasche, die Sie für Ihre Infusion benötigen.




4 Desinfizieren Sie den Injektionsanschluss am Infusionsbeutel mit einem Alkoholtupfer und lassen ihn 30 Sekunden lang trocknen.




5 Nehmen Sie die Kanüle von der Spritze und entsorgen Sie die Kanüle im Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände. Setzen Sie vorher NICHT die Schutzkappe auf die Kanüle. Schrauben Sie die Spritze in den **Port A** und überführen Sie langsam die Agalsidase alfa-Lösung vollständig in den Infusionsbeutel. Nehmen Sie nun die Spritze ab und entsorgen Sie sie im Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände.

Bitte beachten Sie: Sollten Sie gelernt haben mit einer Nadel in den Infusionsbeutel zu spritzen, dann gehen Sie entsprechend jenen Anweisungen aus Ihrer Schulung so vor und überspringen Schritt 5.

Entsorgen Sie die Nadel anschließend im Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände.




6 Nehmen Sie den Infusionsbeutel) vom Infusionsständer und drehen Sie ihn vorsichtig, damit sich Agalsidase alfa gründlich mit der Lösung vermischt. Schütteln Sie den Beutel aber **NICHT**.




7 Hängen Sie den Infusionsbeutel wieder an den Infusionsständer und kontrollieren Sie die Flüssigkeit auf Verfärbungen und Partikel. Wenn die Lösung verfärbt ist und/oder sichtbare Partikel (Teilchen) enthält, dürfen Sie sie **NICHT** verwenden. Wenden Sie sich stattdessen an Ihre behandelnde Klinik/Praxis.

Hinweis: Die Lösung enthält kein Konservierungsmittel und ist bei 25 °C 24 Stunden stabil. Daher wird empfohlen, die Anwendung so schnell wie möglich zu beginnen.


Schließen Sie den Infusionsschlauch an



Drehen Sie die große Kappe vom Infusionsanschluss des Infusionsbeutels ab.




Nehmen Sie das Infusionsset aus der Verpackung, entrollen Sie den Infusionsschlauch und halten Sie ihn an beiden Enden fest. **KEINES** der Enden darf dabei auf den Boden fallen oder mit einer anderen Fläche in Berührung kommen.




Bitte beachten Sie: Wenn Ihr Infusionsset einen vorinstallierten Filter hat, überspringen Sie bitte Schritt 3.


Schließen Sie den Filter an das Infusionsset an (an dem Ende ohne Dorn und mit dem Pfeil in Flussrichtung – zum Patienten hin).




Schließen Sie den Infusionsschlauch mittels Rollklemme.




Nehmen Sie an einem Ende des Infusionsschlauches die Kappe vom Dorn ab und führen Sie ihn in den Infusionsanschluss des Infusionsbeutels ein.




Drücken Sie die Tropfkammer so lange zusammen, bis sie zur Hälfte mit Flüssigkeit gefüllt ist.



Entlüften Sie den Infusionsschlauch, indem Sie die Rollklemme ganz langsam öffnen, so dass die Flüssigkeit langsam durch den Schlauch fließt, bis sie das Ende erreicht.



Achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen im Infusionsschlauch befinden – Sie können das freie Ende aufrecht halten und den Schlauch vorsichtig mit dem Finger „schnippen“, um die Luftblasen herauszulassen.



Schließen Sie zum Schluss die Rollklemme.


03

Verabreichung der Agalsidase alfa-Infusion


Verabreichung der Agalsidase alfa-Infusion

Falls es zu einer Verunreinigung des Handschuhs während des unten beschriebenen Vorgangs kommt, beachten Sie bitte Folgendes:

- Ziehen Sie die Handschuhe aus und entsorgen Sie sie.
- Waschen Sie Ihre Hände mit der richtigen Handwaschtechnik.
- Ziehen Sie ein neues Paar Handschuhe an.



Desinfizieren Sie den Anschluss des Kanülenverlängerung (hier abgebildet), der Flügelkanüle oder der Infusionsportnadel.




Wenn Ihr Infusionsset keinen vorinstallierten Filter hat: Nehmen Sie die Kappe vom Ende des Filters ab und schließen Sie den Filter an die Kanülenverlängerung (hier abgebildet), die Flügelkanüle oder die Infusionsportnadel an.

ODER

Wenn Ihr Infusionsset einen vorinstallierten Filter hat: Schließen Sie das Ende des Verabreichungssets an die Kanülenverlängerung (hier abgebildet), die Flügelkanüle oder die Infusionsportnadel an.

Jetzt beginnt die Infusion.



Öffnen Sie die Rollenklemme am Infusionsset und beginnen Sie die Agalsidase alfa-Infusion bei


Raumtemperatur mit der von Ihrem Arzt angewiesenen Infusionsrate. Verwenden Sie ggf. eine Infusionspumpe.

Die Infusion dauert ungefähr 40 Minuten. Sie können die Tropfgeschwindigkeit mit Hilfe der Rollenklemme anpassen:

- Das gesamte Infusionsvolumen beträgt ca. 100 ml und 1 ml entspricht etwa 20 Tropfen.
- Bei einer 40-minütigen Infusion beträgt die Tropfgeschwindigkeit etwa 12 Tropfen pro 15 Sekunden.

Nach der Infusion


Letzte Schritte nach der Infusion



Sobald der Beutel leer aber der Infusionsschlauch noch gefüllt ist, schließen Sie die Rollklemme. Ersetzen Sie den leeren Infusionsbeutel durch den Spülbeutel und stecken Sie den Dorn der Infusionsleitung in den Spülbeutel um. Öffnen Sie die Rollklemme und lassen einen Teil der Kochsalzlösung (etwa 20 ml) aus dem Spülbeutel in die Vene laufen

So erhalten Sie die vollständige Dosis, einschließlich der Reste im Infusionsset. Schließen Sie dann die Rollklemme.

Bei einem Spülbeutel handelt es sich in der Regel um einen relativ kleinvolumigen Beutel (ca. 100 ml) mit Kochsalzlösung (0,9%ige Natriumchloridlösung [Salzwasser]), der zum Spülen des Infusionssets verwendet wird. Mindestens 20 ml sind generell erforderlich, um sicherzustellen, dass das Arzneimittel vollständig aus dem Infusionsset verabreicht wird.



Legen Sie einen Mulltupfer auf die Einstichstelle, ziehen Sie die Nadel/Kanüle langsam heraus und werfen Sie sie in den Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände. Drücken Sie den Mulltupfer für einige Minuten fest auf die Einstichstelle und versorgen Sie die Wunde, wie mit Ihrem medizinischen Fachpersonal besprochen.

Setzen Sie die Schutzkappe des i.v.-Nadelsets NICHT wieder auf.



Entsorgen Sie nach der Infusion die spitzen Gegenstände (Nadeln oder Kanülen) im Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände.

Nicht verwendetes Arzneimittel und Abfallmaterial können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Dokumentieren Sie am Ende der Behandlung jede Infusion sowie alle Probleme, die möglicherweise bei Ihnen aufgetreten sind, im Infusionstagebuch.

Was zu tun ist, wenn bei der Behandlung mit Agalsidase alfa Nebenwirkungen oder Probleme auftreten

Mögliche Nebenwirkungen von Agalsidase alfa

In klinischen Studien und der medizinischen Praxis seit der Zulassung 2001 wurden Nebenwirkungen hauptsächlich während der Infusion oder kurz danach beobachtet.

Infusionsbedingte Reaktionen, die ein zügiges Eingreifen erfordern, wurden gelegentlich berichtet. Achten Sie dafür auf folgende Symptome: Fieber, Muskelsteifheit, Herzrasen, Rötungen der Haut, Übelkeit/Erbrechen, plötzlich auftretende Schwellungen der Zunge mit Engegefühl im Hals und ein pfeifendes Geräusch beim Einatmen.

Wenn Sie bei sich eines der oben genannten Symptome feststellen, informieren Sie Ihre Betreuungsperson und gehen Sie nach Ihrem Notfallplan vor bzw. wie Ihr Arzt es mit Ihnen vereinbart hat. Dazu kann z.B. gehören, dass die Infusion vorübergehend unterbrochen oder sofort beendet wird.

Ihr Arzt wird Ihnen möglicherweise auch Arzneimittel und Instrumente zur Behandlung von Notfällen verschreiben, die Sie zu Hause zur Hand haben müssen.

Wenn bei Ihnen eine schwere Nebenwirkung aufgetreten ist, wird Ihr Arzt möglicherweise entscheiden, dass nachfolgende Infusionen zunächst wieder in einem Krankenhaus, einer Arztpraxis oder einer anderen medizinischen Einrichtung stattfinden.

Wenn oben genannte Reaktionen auftreten, handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan (Seite 12).

Probleme, die bei der Verabreichung von Agalsidase alfa auftreten könnten

Zu den Problemen, die rund um die Verabreichung von Agalsidase alfa auftreten können, gehören unter anderem:

- Falsches Zubehör für die Verabreichung oder Zubehör, das nicht richtig funktioniert oder bei dem Störungen auftreten
- Eine nicht korrekte Verabreichung von Agalsidase alfa (z. B. Medikationsfehler, zu schnelle Infusionsrate)
- Kontamination der Infusionsmaterialien
- Haut- oder Gewebereaktionen an der Einstichstelle der Nadel (oder Kanüle), einschließlich Rötung, Schmerzen, Schwellung, Bluterguss, Blutung und Infektion

Wenn eines der vorgenannten Probleme auftritt, stoppen oder beginnen Sie gar nicht erst mit der Infusion und besprechen Sie den Fall mit Ihrem behandelnden Arzt oder Apotheker.

Melden Sie alle Nebenwirkungen

Die hier genannten sind nicht alle möglichen Nebenwirkungen, die bei der Behandlung mit Agalsidase alfa auftreten können.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Sie können Nebenwirkungen auch direkt hier anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Webseite: www.bfarm.de


Bitte geben Sie bei der Meldung so viele Informationen wie möglich an, einschließlich einer Beschreibung aller Nebenwirkungen oder Probleme und der entsprechenden Maßnahmen/Behandlungen, der eingenommenen oder angewandten Medikamente, Datum und Zeitpunkt der Einnahme/Verabreichung, Namen anderer Medikamente, die Sie einnehmen und gesundheitlicher Probleme usw.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Sicherheits- und Notfallplan für die Infusion von Agalsidase alfa zu Hause

Ihr behandelnder Arzt gibt Ihnen und Ihrer Betreuungsperson hier individuelle Anweisungen.

Notwendige Maßnahmen im Falle einer schwerwiegenden Infusionsreaktion, Überempfindlichkeitsreaktion und/oder unerwünschten Reaktion:





In der App Gebrauchsinformation 4.0 / GI 4.0 finden Sie die aktuelle Version der Gebrauchsinformation zu Replagal sowie diesen Leitfaden im elektronischen Format.





Infusionstagebuch

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

08

Infusionstagebuch

Die Dokumentation der Infusionen unterstützt Sie bei der Einhaltung Ihres Therapieplans und dient der Kommunikation mit Ihrem behandelnden Arzt.

Notieren Sie im Infusionstagebuch alle Infusionen und auch alle Fragen und Bedenken, die Sie haben, um sie im späteren Arztgespräch griffbereit zu haben.

Nehmen Sie Ihr Infusionstagebuch zu jedem Arzttermin mit.

Wenn Sie die letzten Seiten des Infusionstagebuchs erreicht haben, bitten Sie Ihren behandelnden Arzt um ein neues Behandlungstagebuch. Alternativ finden Sie diesen Leitfaden inkl. Infusionstagebuch im elektronischen Format unter <https://www.gebrauchsinformation4-0.de/> oder in der App Gebrauchsinformation 4.0 / GI 4.0.

Beachten Sie, dass Sie ausführliche Anweisungen und eine angemessene Schulung zur Selbstverabreichung von Agalsidase alfa erhalten müssen und dass Sie oder Ihre Betreuungsperson die Fähigkeit zur selbständigen Verabreichung von Agalsidase alfa nachgewiesen haben.

Dieses Infusionstagebuch gehört

Name	
Telefonnummer	
Für Infusionen ab (Datum)	

Wichtige Kontaktpersonen

Name und Kontaktdaten Ihres behandelnden Arztes	
Name und Kontaktdaten Ihrer Apotheke	
Name und Kontaktdaten Ihrer Betreuungsperson	
Kontakt für Notfälle/ außerhalb der normalen Klinik-/ Sprechstundenzeiten	

Ihre Dosis

Wichtig: Ihr Arzt wird Ihre Agalsidase alfa-Dosis für Sie berechnen und Ihnen diesen Abschnitt zur Dosis und Infusionszeit/-rate ausfüllen. Ändern Sie die Dosis nicht selbst.

Datum		
Ihr Körpergewicht		Bitte besprechen Sie bei Gewichtsveränderung eine mögliche Dosisanpassung mit Ihrem behandelnden Arzt.
Dosis		
Anzahl der erforderlichen Agalsidase alfa-Durchstechflaschen		
Notizen zur Infusionszeit /-rate		
Prämedikation		
Zusätzliche Hinweise		

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.


Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.


Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.


Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.


Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.


Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.


Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.


Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.


Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.


Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

08

Eintrag im Infusionstagebuch

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.

Ankreuzen, wenn Ihre Betreuungsperson anwesend ist

Datum der Infusion	
Ihr Körpergewicht	
Dosis	
Geben Sie gegebenenfalls alle zusätzlichen Medikamente an, die Sie vor der Infusion eingenommen oder angewendet haben.	


Notizen:

Notieren Sie hier aufgetretene Nebenwirkungen und die Chargennummer der Durchstechflaschen, mit denen die Nebenwirkungen aufgetreten sind. Notieren Sie ebenfalls sonstige Probleme mit der Infusion und was dagegen unternommen wurde.


In welchem Arm ist die Infusion verabreicht worden?

Links Rechts

Welche Infusionsstelle haben Sie verwendet?



Ellenbeuge



Handrücken

Wechseln Sie nach Möglichkeit bei jeder Infusion die Infusionsstelle.

Start (Uhrzeit)	Stunde	Minute
Ende (Uhrzeit)	Stunde	Minute

Die Infusion wurde über ein Portkatheter verabreicht.

Wenn bei Ihnen infusionsbedingte Nebenwirkungen auftreten, die anhalten oder schlimmer werden, brechen Sie die Infusion ab und handeln Sie nach den mit Ihrem behandelnden Arzt vereinbarten Notfallplan.



In der App Gebrauchsinformation 4.0 / GI 4.0 finden Sie die aktuelle Version der Gebrauchsinformation zu Replagal sowie diesen Leitfaden im elektronischen Format.



Version 1 | Oktober 2023

Copyright 2022 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Alle Rechte vorbehalten.

