




Miscanthus-Anbaufläche von Herrn Pohle in Ditfurt

Pflanzung im Mai 2007





Miscanthusfläche in Ditfurt, Aufnahme vom 22.07.07



Nagara

M x giganteus



Amuri, im September 2007

Amuri

Bemerkenswert:

Nagara und Amuri wachsen nach der Pflanzung wesentlich schneller als *Miscanthus x giganteus*.

Die Gefahr durch Verunkrautung ist deshalb im Pflanzjahr bei *Miscanthus x giganteus* wesentlich höher.

Dieser Vorteil von Nagara und Amuri wurde auch auf anderen Standorten bestätigt.

September 2007




Sorte Nagara in den Außenreihen



03.07.2007

Miscanthus-Anbaufläche in Ditfurt, September 2009

Zwischen Nagara und *Miscanthus x giganteus* zeigten sich im Bestand des dritten Aufwuchs keine wesentlichen sichtbaren Unterschiede.





Die gepflanzten drei Genotypen der Mehrklonsorte Amuri erreichten nicht die Höhe von Nagara und *Miscanthus x giganteus* und sie hatten dünnere, aber wesentlich mehr Halme als Nagara und *Miscanthus x giganteus*

Ein Ertragsvergleich soll im Frühjahr 2010 erfolgen.

