

Neue paläarktische Käfer.

Von Edm. Reitter in Paskau.

Tanyproctus (Brachydema) adanensis n. sp.

Dem *T. Demaisonii* Reitt. Tab. 50, p. 122 von Adana sehr ähnlich und von dieser Art in nachfolgenden Punkten abweichend. Clypeus in der Mitte des Vorderrandes mit einem scharfeckigen, mäßig tiefen Ausschnitte. Schildchen fast glatt. Halsschild auch auf der Scheibe mit Gruppen langer Haare. Flügeldecken, außer den sehr kurzen Härchen in den Punkten. Mit 4—5 unregelmäßigen Reihen, langer schräg abstehender Haare untermengt; auch die Seitenränder des Körpers dichter behaart, die Behaarung mehr weiß als gelblich, Vorderkörper der Unterseite dichter und länger behaart. Pygidium vorne einzeln lang behaart. Die Vordertarsen schlank, aber deutlich etwas erweitert. — L. 11 mm. — Adana.

Malachinus persimplex n. sp.

Dem *M. affinis* Mén. täuschend ähnlich, aber die Oberseite hat keine aufstehende Behaarung, sondern die Behaarung ist einfach, äußerst fein, kurz, greis, fast staubförmig. Grün, glänzend, die Basalglieder der fast einfachen Fühler (♂♀) auf der Unterseite, das dritte beim ♂ auch oberseits, der Kopf unterhalb der Augen, die Palpen (bis auf die äußerste Spitze des Endgliedes) die Vorder-schienen zur Spitze und die Tarsen mehr weniger braungelb gefärbt. Erstes Fühlerglied etwas dicker als die folgenden, Kopf beim ♀ grün, beim ♂ der Vorderrand des Clypeus gelb, zwischen den Augen mit queren Eindrücke, Halsschild schwach quer, etwas gerundet, fast glatt, Basis randförmig abgesetzt. Schildchen glatt. Flügeldecken sehr fein gerunzelt, kaum punktiert, einfarbig in beiden Geschlechtern. L. 5 mm.

Mantschuria. Zahlreich im Moskauer Universitätsmuseum vertreten.

Mycetochara flavipennis n. sp.

♂ der *M. linearis* Illig. täuschend ähnlich, aber anders gefärbt, die Fühler sind länger, der Thorax schmaler, die geneigte, schwarze Behaarung länger.

Schwarz, Fühler braun, die 4 ersten Glieder und das Endglied braungelb, die Palpen, Beine und die Flügeldecken rötlichgelb. Die Fühlerglieder 3 bis 10 viel länger wie doppelt so lang als breit, Thorax viel schmaler als die Flügeldecken. Long. 6,5 mm. —

Italien-Bazzano; Von Herrn Sekera entdeckt. 1 ♂.

Diese Art ist nicht zu verwechseln mit *linearis* ♂, var. mit rötlichbraunen Flügeldecken, wie sie aus der Herzogowina kenne; bei dieser sind die mittleren Fühlerglieder kürzer und dicker.

Literatur-Referate.

Die Herren Autoren von selbständig oder in Zeitschriften erscheinenden **coleopterologischen** Publikationen werden um gefl. Einsendung von Rezensionsexemplaren oder Sonderabdrücken gebeten.

Selbstreferate der Herren Forstentomologen sind besonders erwünscht.

F. Sokolář. Das Reinigen der Käfer und manches, was damit zusammenhängt. Ent. Wochenbl. (Ins. Börse) 1908.

Verfasser verbreitet sich zunächst ausführlich über die Farben, Zeichnung usw. der Oberseite der Käfer sowie über die Arten der Verunreinigung. Hierbei sind äußere Beschmutzung (Anhaften von Erde, vegetabilischen und animalischen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Neue paläarktische Käfer. 129](#)