

Seltene Hypogäen in Mainfranken (MTB 6223 Wertheim)

R. A. HINTZ

Schönbornstr. 4
D-6000 Frankfurt/M

W. WINTERHOFF

Keplerstr. 14
D-6902 Sandhausen

Eingegangen am 20.10.1982

Hintz, R. A. & W. Winterhoff (1983) – Occurrence of rare hypogeous fungi in Mainfranken (FRG). Z. Mykol. 49(1): 51–60

Key words: *Sclerogaster compactus* (Tul. & Tul) Sacc.; *Gautieria morchellaeformis* (Vitt.); *Hymenogaster bulliardii* (Vitt.), *H. hessei* (Soehn. f. bisporus), *H. luteus* (Vitt.), *H. tener* (Bk.); *Hysterangium nephriticum* (Bk.), *H. stoloniferum* s. l.; *Rhizopogon luteolus* (Fr. & N.), *R. luterorubescens* (A. H. Smith), *R. vulgaris* var. *intermed.* (Svrcek); *Glomus macrocarpus* var. *macr.* (Tul. & Tul.).

Abstract: Two rare species of hypogeous fungi, found in northern Baden-Württemberg (FRG), are described. Ecological observations and the occurrence of other hypogeous fungi are discussed.

Zusammenfassung: Zwei seltene Arten hypogäischer Pilze, die im nördlichen Baden-Württemberg (BRD, MTB 6223 Wertheim) gefunden wurden, werden beschrieben und Beobachtungen über ökologische Bedingungen und das Vorkommen anderer Hypogäen mitgeteilt.

1. Einleitung

In einem nur 1,5 x 0,3 km großen, locker mit Laub- und Nadelgehölzen bestandenen NW-Hang mit 5–14° Gefälle im Grenzgebiet des oberen Buntsandsteins zum unteren Muschelkalk konnten in den Monaten Mai, Juni, Juli der Jahre 1981 und 1982 einerseits zahlenmäßig reiche Funde von *Hysterangium stoloniferum* s. l. und *Rhizopogon luterorubescens* gemacht werden, andererseits gelangen Funde der sehr seltenen Art *Sclerogaster compactus* und der relativ seltenen Art *Gautieria morchellaeformis*. Über Funde der Gattung *Sclerogaster* wurde in der BRD zuletzt 1949 von Soehner, davor 1891 von Hesse berichtet.

Die Beschreibung der Vegetation erfolgte durch W. Winterhoff, die des Bodens und der Hypogäen durch R. A. Hintz. Die Übertragung der mikroskopischen Ansichten in Zeichnungen gestaltete Renate Grau-Hintz. G. Groß übernahm die Absicherung der problematischen oder kritischen Bestimmungen.

2. Topographie und Geologie

Das Fundgebiet liegt etwa 1,5 km von einer Mainschlinge entfernt in der Nähe von Wertheim (Main), 260 m über NN an einem Nord-West-Hang (Neigung etwa 10°). Er

ist Teil eines nach Westen gerichteten Vorsprungs von unterem Muschelkalk. Den Südhang nimmt ein Weinberg ein.

Der Boden ist als Rendzina (Terra fusca) anzusprechen, obwohl im einzelnen mit stärkerer Differenzierung gerechnet werden muß. So schwanken die mit Indikatorpapier erhaltenen pH-Werte des oberflächennahen Bodens zwischen 5,5–7 (8). Die Bindigkeit (als Maß für den Tonanteil und damit für die Fähigkeit Wasser zu binden) sowie der Humusgehalt des Bodens schwanken beträchtlich.

Die geologische Situation erklärt diese Erscheinung: An der Grenze vom oberen Buntsandstein (Röt), der häufig tonig, mergelig ausgebildet ist (an Südhängen geschätzte Rebböden) zum unteren Muschelkalk mit seinen kalkig tonigen Ablagerungen können sich an einem Hang dieser Neigung die verschiedensten Übergänge ausbilden. Mikroerosionseffekte können zu Tonanreicherungen in kleinen Mulden oder zu Auswaschungen an den Muldenkanten führen. Hinzu kommt, daß diese Bodenvermischung die Zahl der verfügbaren chemischen Elemente günstig beeinflusst haben kann.

3. Klima

Das Klima in der Umgebung kann als recht warm und niederschlagsarm bezeichnet werden. Nach dem Klima-Atlas von Baden-Württemberg liegt die mittlere Julitemperatur bei 18° C, die mittlere Januartemperatur zwischen 0° C und –1° C. Die mittlere jährliche Niederschlagssumme beträgt hier im Regenschatten von Odenwald und Spessart nur etwa 600 mm.

4. Vegetation

Um die Zusammensetzung der Vegetation möglichst genau zu erfassen, haben wir an den Fundorten von *Sclerogaster compactus* (Fläche 1), *Gautieria morchellaeformis* (Fläche 2) und *Hysterangium stoloniferum* (Fläche 3) je eine 100 m² große Vegetationsaufnahme nach der Methode von Braun-Blanquet gemacht. Wir beschränken uns hier darauf, die wesentlichen Merkmale mitzuteilen. Die vollständigen Aufnahmen stehen Interessenten auf Anfrage zur Verfügung.

Die Flächen 1 und 2 liegen nur wenige m vom unteren Waldrand entfernt, Fläche 3 dagegen mitten am bewaldeten Hang. Die Vegetation aller drei Flächen ist sehr ähnlich.

Die ca. 20 m hohe Baumschicht deckt 80–90 %. Sie wird von Kiefer (*Pinus sylvestris*), Buche (*Fagus sylvatica*), Kirsche (*Prunus avium*), Eiche (*Quercus petraea* in 1 und 3, *Quercus robur* in 2) und Wildbirne (*Pyrus communis*) gebildet. Der vorherrschende Baum ist in 1 und 2 die Kiefer, in 3 die Buche.

Die Strauchschicht ist in den waldrandnahen Flächen 1 und 2 mit 15 bzw. 5 % Deckung dichter als in Fläche 3 mit nur 1 % Deckung. Sie besteht aus jungen Laubbäumen: Buche, Kirsche, Waldbirne, Esche (*Fraxinus excelsior*) und Elsbeere (*Sorbus torminalis*), sowie aus zahlreichen Straucharten: *Lonicera xylosteum*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum lantana*, *Ligustrum vulgare*, *Prunus spinosa*, *Cornus sanguinea* und *Juniperus communis*.

Die Krautschicht ist in allen drei Flächen mit ca. 10–15 % Deckung nur spärlich ausgebildet. Vorherrschend sind Grasartige (*Brachypodium pinnatum*, *Carex montana*, *C. flacca*, *C. ornithopoda*). Dazwischen stehen wenige Kräuter wie *Euphorbia cyparissias*, *Taraxacum officinale*, *Viola reichenbachiana*, *V. hirta*, *Fragaria vesca* und *Cephalanthera damasonium*. Dazu kommen vereinzelt Keimlinge von 5 Laubbaumarten und 17 Straucharten.

Moose fehlen in Fläche 3 ganz und decken auch in den Flächen 1 und 2 nur etwa 0,3 %. Die Mooschicht ist auf kleine Buckel und Böschungen beschränkt, von denen das Fall-

laub verweht wird. Die kleinen lockeren Moosrasen aus *Brachythecium velutinum*, *B. rutabulum*, *Eurhynchium striatum*, *Fissidens adiantoides* und *Mnium affine* dürften für das Vorkommen von Pilzen keine Rolle spielen.

Mehrere Pflanzenarten geben durch ihr Vorkommen Hinweise auf den Standort: *Pyrus communis*, *Sorbus torminalis*, *Ligustrum vulgare* und *Viburnum lantana* gelten nach Oberdorfer (1979) als wärmeliebend. *Prunus avium*, *Carex montana* und *C. flacca* bevorzugen tonige Böden. Säurezeiger fehlen.

Der Bestand stellt keine naturnahe Waldgesellschaft dar, denn die Kiefer ist hier standortsfremd, verjüngt sich nicht und verdankt ihr Vorkommen nur früherer Anpflanzung. In der Zusammensetzung des Laubholzanteils, in dem Artenreichtum der Strauchschicht und in einigen Arten der Krautschicht (*Carex montana*, *C. flacca*, *C. ornithopoda*, *Cephalanthera damasonium* und *Viola hirta*) besteht jedoch große Ähnlichkeit mit dem Seggen-Buchenwald (*Carici-Fagetum*), der im Gebiet an Muschelkalkhängen als natürliche Vegetation auftritt.

Der jetzige Kiefern-Mischwald stellt sicher keine Dauergesellschaft, sondern nur ein vorübergehendes Entwicklungsstadium dar. Mehrere Indizien sprechen dafür, daß eine offener Vegetation (vielleicht eine Schafweide mit einzelnen Büschen und Bäumen) vorausgegangen ist: In Fläche 1 sind flache Böschungen als frühere Parzellengrenzen erkennbar. Das jetzt steril vegetierende, lichtliebende Schafweidegras *Brachypodium pinnatum* stellt in diesem Wald wahrscheinlich ein Relikt dar. Echte Waldpflanzen fehlen (noch) fast ganz. Die weitere Entwicklung könnte zu einem etwas schattigeren kiefernfreien Buchen-Mischwald führen, in dem es zu stärkerer Streuanhäufung und Humusbildung kommen dürfte. Dadurch würde den kiefergebundenen *Rhizopogon*-Arten ihr Mykorrhizapartner entzogen, und es wären auch weitere Änderungen der Pilzflora zu erwarten.

5. Übersicht über die Funde

Tabelle 1 gibt die wichtigsten Sporendaten über die Funde. Eine bestimmte Vergesellschaftung mit Laub- oder Nadelgehölzen bestand nur für die *Rhizopogon*arten, die stets in Stammnähe von Kiefern oder wenigstens unter Mischungen von dünner Laub- und Nadelstreu gefunden wurden. Es scheint, daß im Fundgebiet die kleinräumigen Bedingungen, die Graswuchs nicht mehr zulassen, und eine dünne Streuschicht, die eine gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit begünstigt, für ein Fruktifizieren von größerer Bedeutung sind. Die Funde gelangen in den Monaten Mai bis Juli der Jahre 1981 und 1982. Pro Fund wurden jeweils etwa 12 Sporen gemessen.

6. Beschreibung der Arten und Besonderheiten

Die meisten Funde entsprechen so weitgehend den bekannten Beschreibungen (z. B. Groß, Runge, Winterhoff 1980), daß den Angaben in der Übersicht (Tabelle 1) nichts hinzuzufügen ist. Eingehender werden daher nur *Sclerogaster compactus* und *Gautieria morchellaeformis* beschrieben und einige Beobachtungen bei *Hysterangium stoloniferum* und *Rhizopogon luteorubescens* mitgeteilt.

6.1 *Sclerogaster compactus*

F u n d o r t: Locker bestandener Nord-West-Hang in einem Weinbaugebiet, 10 m von einem mit niedrigem Gehölz bestandenen Waldrand. Am Fuß einer Rotbuche (*Fagus sylvatica*) an der tiefer gelegenen Seite einer quer zum Bodengefälle aus dem Boden herausragenden Wurzel, in durch weißes Myzel dicht versponnenem Gemisch von relativ lockerer Laub- und Nadelstreu.

Tabelle 1: Übersicht über die Funde und die Sporenmaße

| Gattung/Art | Zahl der Funde | Sporenmaße ($\mu\text{m} \pm 10\%$) (mit Ornament) | | |
|---|----------------------|---|--------|----------------------|
| | | Länge | Breite | L/B |
| <i>Sclerogaster compactus</i> , Tul. & Tul., Sacc. | 1 | 5,58 | 4,08 | 1,37 |
| <i>Gautieria morchellaeformis</i> , Vitt. var. <i>morchellaeformis</i> | 2 | 20,09 | 11,26 | 1,82 |
| Hymenogaster Vittadini | | | | |
| <i>H. bulliardii</i> Vitt. var. <i>bulliardii</i> | 2 | 24,12 | 12,57 | 1,92 |
| <i>H. hessei</i> Soehn. f. <i>bisporus</i> | 1 | 25,60 | 12,20 | 1,86 |
| <i>H. luteus</i> Vitt. var. <i>luteus</i> | 1 | 20,90 | 7,74 | 2,70 |
| <i>H. tener</i> Bk. | 1 | 19,11 | 10,28 | 1,86 |
| Hysterangium Vittadini | | | | |
| <i>H. nephriticum</i> Bk. | 4 | 18,50 | 6,20 | 2,98 |
| <i>H. stoloniferum</i> var. <i>rubescens</i> Quél., Z. & D. | 11 | 21,07 | 6,43 | 3,29 |
| <i>H. stoloniferum</i> Tul. & Tul. var. <i>stoloniferum</i> | 7 | 21,13 | 6,44 | 3,30 |
| <i>H. stoloniferum</i> s. l. | 10 | 20,71 | 6,50 | 3,19 |
| Rhizopogon Fries & Nordh. | | | | Vol. μm^3 |
| <i>R. luteolus</i> Fr. & N. emend. Tul. & Tul. | 1 | 7,35 | 3,21 | 39 |
| <i>R. vulgaris</i> var. <i>intermedius</i> Svrček | 1 | 6,85 | 2,84 | 31 |
| <i>R. luteorubescens</i> A. H. Smith | 21 | 7,70 | 3,35 | 45 |
| <i>Glomus macrocarpus</i> var. <i>macroc.</i> Tul. & Tul. | 1 | 150 | 125 | 1,20 |
| Unsichere Arten | | | | |
| <i>Tuber</i> spec. | 2 | — | — | — |

F u n d z e i t: Ende Mai 1981

F r u c h t k ö r p e r: 1–1,5 cm Durchmesser und kleiner, rundlich; weiß, an Druckstelle ockerlich. Die Fruchtkörper waren fest und dicht mit Myzel überwachsen, in dem Laubreste hafteten. Geruch: pilzig. (Bild 1 a).

P e r i d i e: Teils von flockiger weißer Hyphenschicht (mit Kristalleinlagerungen) umspinnen, teils ohne diese äußere Schicht und statt dessen mit einem Saum aus dünnwandigen haarartigen Hyphen von 2–5 μm Dicke. Nach innen lassen sich zwei Schichten unterscheiden: eine 100–150 μm dicke dunkelbraune Schicht aus Hyphen von 2–5 μm Dicke, die bei gekreuztem polarisiertem Licht hell erscheinen, d. h. doppelt brechende Kristalle enthalten, und eine hellbraune bis gelbliche Schicht von 200 μm Dicke aus dünneren wirr verflochtenen Hyphen. Nach innen zu folgen parallel orientierte Tramahyphen. Eine Verbindung dieser Tramahyphen mit der Peridie scheint nicht zu bestehen. Im Dünnschnitt am frischen Gefrierpräparat löste sich die Peridie leicht ab. Bei der Einbettung in Kaisers Glyzeringelatine löste sich aus der Peridie brauner Farbstoff, der als brauner Ring um das Präparat sichtbar wurde, was allerdings auch bei anderen Hypogäen nicht selten ist. Die Peridienfarbe ging von gelblich-grünlich bis bräunlich. (Bild 1 b–d).

G l e b a: Im Querschnitt zeigt die Gleba kleine luftgefüllte oder dicht mit Sporen gefüllte Kammern. Die Kammern sind länglich rundlich (300 x 150 μm). Einzelne luftgefüllte Kammern werden von dünnen Hyphen durchzogen. Von einer zentralen Columella, die stumpf-kegelförmig in die Gleba eindringt, verzweigen sich unregelmäßig Tramaäste. Eine vorherrschende Orientierung ist nicht zu erkennen. (Bild 1 a).

B a s i d i e n: Zylindrisch abgerundet ($25 \times 7 \mu\text{m}$) mit 6–8 kurzgestielten Basidiosporen an der Kuppe. Von oben gesehen oft regelmäßig 6sporig, z. T. bei zusammengefallener Basidie wie an Fäden. (Bild 1 e).

B a s i d i o s p o r e n: Kugelförmig mit Sterigmen, Gesamtlänge $5,6 \pm 0,4 \mu\text{m}$, Durchmesser $4,1 \pm 0,3 \mu\text{m}$. Sterigmen etwa $1 \mu\text{m}$ lang. Farbe: hyalin. Oberfläche: stachelig bis warzig (etwa 10–12 Erhebungen auf dem Sporenumfang). Eine eindeutige Unterscheidung scheint im Lichtmikroskop nicht möglich. Die von Pegler und Young (1979) abgebildeten elektronenmikroskopischen Aufnahmen von Sporen des von Hawker (1953) untersuchten Exemplars haben eine viel größere Ornamentierung, die bei der lichtmikroskopischen Betrachtung nicht als ähnlich erscheint. Eine Abhängigkeit der Ornamentausbildung vom Entwicklungsstand der Gleba ist wahrscheinlich. So wurden in einer grünlichen Gleba eher „stachelige“ Sporen beobachtet, in einer bräunlichen Gleba eher „warzige“ Sporen. (Bild 1 f).

Anmerkung: Der Fund wurde als *S. compactus* bestimmt, obwohl die Abgrenzung zu *S. lanatus* nicht eindeutig ist. In der Literatur herrscht Einigkeit über die Sporenform, nicht aber über Größe und Ornamentierung. Abweichungen in der Größe könnten auch auf unterschiedliche Beobachtungsmethoden zurückzuführen sein. So ist auffällig, daß Dodge & Zeller (1936) sowohl bei *S. compactus* als auch bei *S. lanatus* 4–6 μm angeben, während Soehner (1949) für beide Arten 3–4 μm angibt (Tabelle 2).

Die Beschreibung der Sporenornamentierung überdeckt sich für beide Arten in einem weiten Bereich:

S. compactus: glatt – zartest rauh – rauh – spärlich winzige Warzen – mäßige, niedrige, abgestumpfte Warzen – warzig – stachelig;

S. lanatus: glatt – fast glatt – sehr kleine Wäzchen.

Die zur Unterscheidung herangezogene Ausbildung der Peridie ist auch nicht eindeutig: als kritisches Merkmal für *S. lanatus* wird ein äußeres weißes Hyphengeflecht von ca. 50 μm Dicke mit häufigen Kristalleinlagerungen angegeben. Andererseits wird in der Literatur unabhängig von den beiden Arten vermerkt, daß am Myzel häufig Kristalle haften und daß die Fruchtkörper dicht von diesem Myzel umspinnen sind. Die Beschreibung des den Fruchtkörper einhüllenden Myzels und der äußeren lockeren, wolligen Peridien-schicht ist deskriptiv schwer zu trennen.

Bei den jetzt gefundenen Fruchtkörpern war teilweise die von Hesse angegebene, mit Kristalleinlagerungen durchsetzte wollige äußere Peridien-schicht zu sehen, teils nur eine sehr dünne, bräunliche haarige Außenschicht, der nach innen zuerst ein 100–150 μm dickes, wirres braunes und dann ein etwa 200 μm dickes, wirres gelblich-bräunliches Hyphengeflecht folgte. Danach abgesetzt folgten parallel zur Oberfläche angeordnete Trama-hyphen. An dieser Stelle löste sich die Peridie beim Präparieren ab. Eine deutliche Trennung der Peridien-schichten zeigte sich bei gekreuztem polarisiertem Licht, in dem nur doppelt brechende Medien hell und meist farbig erscheinen. In diesem Fall waren die Einlagerungen von Kalziumoxalatkristallen sowohl in der wolligen Außenschicht als auch in der dunkelbraunen äußeren Schicht sehr klein, aber so zahlreich, daß die ganze Schicht hell erschien und das Auslösen einzelner Kristalle bei Änderung der Polarisationsrichtung nur schwer zu beobachten war.

Ein Unterschied im Aufbau der Peridie bei vorhandener und fehlender wolliger Außenschicht war nicht zu erkennen. Eine Pseudoparenchym-schicht war ebenfalls nicht zu beobachten. Allerdings bestand eine gewisse Ähnlichkeit bei verdickten querschnittenen Hyphen.

Tabelle 2: Vergleichende Zusammenstellung der in der Literatur verzeichneten Beobachtungen über Peridienaufbau und Basidiosporen von *Sclerogaster compactus* und *S. lanatus*. Wiederholt beschriebene Funde wurden nicht noch einmal aufgenommen, um die Übersichtlichkeit nicht zu beeinträchtigen.

| Autor Jahr (Fund) | P e r i d i e (Schichtaufbau von außen nach innen = von oben nach unten) | | B a s i d i o s p o r e n (Gr = Größe, F = Farbe, Ob = Oberfläche) | |
|---|--|--|--|---|
| | <i>S. compactus</i> | <i>S. lanatus</i> | <i>S. compactus</i> | <i>S. lanatus</i> |
| Tulasne 1851 (Südfrankreich 1844) | - wirres weißes Baumwollgespinst z.T. schmutzige Flächen, dick, nicht ablösbar | | Gr: 5,6-6,4 µm F: gelblich Ob: glatt - rau | |
| Hesse 1891 (Kassel 1887) | | - eine Linie dick (10-50 µm(?), weißes wolliges mit Kalzi- umoxalat verkrustetes Hyphen geflecht, - strukturlose Hyphen | | Gr: 3-4 µm F: ocker-gelb Ob: sehr kleine Wärzchen |
| Dodge & Zeller 1936 (Kent) | - lockeres flockiges Myzel - 120-140 µm große, locker verwobene, dünnwandige Hyphen | - 40 µm locker verwobene Hyphen mit häufigen Kristalleinlagerungen, stellenweise ablösend - 280 µm tramaähnliche Hyphen | Gr: 4-6 µm Ob: dickwandig Ob: spärliche win- zige Warzen | Gr: 4-6 µm Ob: dickwandig Ob: glatt oder fast glatt |
| Soehner 1949 (S. lumat. 1935 Bayern, S. comp. 1933 Bayern) | - weißes, wollig-filziges Myzel - 60-100 µm lockeres, wirres nicht krennbares Hyphen- geflecht Hyphen dünnwandig | - bis 50 µm dicht mit Kristallen besetzt - 250 µm Trama - Hyphen | Gr: 3-4 (5) µm F: hyalin-gelblich Ob: zartest rau | Gr: 3-4 µm F: reif/ocker- gelb, dickwandig Ob: Zit. Hesse |
| Hawker 1953 (S. comp. 195? England) | - weißes lockeres flockiges Myzel - äußere Haarschicht, Hyphen (2-3 µm Ø) - 100-300 µm aufgeblasene Hyphen, nach innen dünner verwend, in Tramahyphen übergehend. | Zitat Dodge & Zeller (1936) | Gr: 4-6 µm F: blaßgelb - braun dickwandig Ob: spärliche, winzige War- zen | Zitat Dodge & Zeller (1936) |
| Knapp Sv rček 1958 (S. comp. CSSR 1955) | Literaturvergleich | | | |
| | - weißes hyphiges Myzel - 28-42 µm dicke äußere Schicht - 90-180 µm pseudoparen- chymatische innere Schicht | Zitat: Soehner, Dodge & Zeller | Gr: 5-6 (-7) µm F: - Ob: fein, winzig warzig-rauh (fast glatt) | |
| Pegler & Young 1979 (S. comp. von Hawker) | | | Gr: 5-7 x 4,5-6 µm (mit Ornament) Ob: dicht, unregel- mäßig, niedrige abgestumpfte Warzen (0,4-0,7 x 0,3- 0,5 µm) | |
| Groß, Runge, Win- terhoff 1980 | Literaturvergleich | | | |
| Hintz (BadWürtt. 1981) | - 50 µm haarige Hyphen - 100-150 µm dkl. braune Hyphen mit Kristalleinlag. - 200 µm hellbraune Hyphen - Gleba abgesetzt paral- lel_hyphig | - 50-100 µm weiße Hy- phen mit Kristallein- lagerungen - 100-150 µm dunkelbrau- nes wirres Hyphenge- flecht mit Kristallein- - 200 µm hellbraunes wir- res Hyphengeflecht - Gleba abgesetzt paral- lel_hyphig | Gr: 5-6 x 3,7-4,4 µm (mit Ornament u. Sterigma) F: hyalin Ob: warzig bis dichtstachelig Gleba: weißlich/ grünlich | Gr: siehe S. comp. F: hyalin Ob: ohne deut- liche Stacheln Gleba: ockerl. |

6.2. *Gautieria morchellaeformis*

F u n d o r t: Am Westrand eines bewaldeten Nord-West-Hangs an einer Eiche (*Quercus robur*). Ein Fund an der Nordseite, ein Fund an der Südseite der Eiche. Der Boden war bindig und humos. An der gleichen Stelle wurde *Hysterangium stoloniferum* s. l. gefun-
den.

F r u c h t k ö r p e r: 1,5 cm Durchmesser, rundlich, von weißlichgrauer Farbe und fester
Konsistenz, ohne Peridie, mit kräftigem Basismyzelstrang. Geruch: pilzig.

Peridie: Reste von Kugelzellenparenchym auf den Glebavorsprüngen.

Gleba: Große, offene Kammern mit großer Columella.

Basidien: Nicht beobachtet.

Sporen: Bräunlich mit Längswulsten, $18,5 \times 11,0 \mu\text{m} \pm 10\%$ (Bild 1 g–j).

Anmerkung: Das Bild der *Gautieriasporen* ist im Lichtmikroskop nur sehr schwer eindeutig zu beobachten, weil die Längswulste und der relativ zur Einbettungsflüssigkeit hohe Brechungsindex der Sporen starke Brechungseffekte (Lichtlinien) verursachen, die Variationen der Ornamentierung vortäuschen können. Beobachtungen in Wasser oder verdünnter KOH führen zu anderen Bildern als solche in höher brechenden Ölen. Die tatsächliche Sporenform muß durch Konstruktion aus Detailschnitten erschlossen werden.

6.3 *Hysterangium stoloniferum*

H. stoloniferum s. l. ist im Fundgebiet relativ häufig. Auf der von Winterhoff beschriebenen Fläche 3 und in der näheren Umgebung befanden sich 1981 50–100 Fruchtkörper von Größen bis zu 20 mm Durchmesser. Gemeinsam war allen Vorkommen nur, daß der Boden sehr locker mit niedriger Vegetation bedeckt war.

Interessant war folgende Beobachtung: Bei den Funden im Jahr 1981 war das schnelle Gilben der Peridienschnittfläche (einziges Merkmal zur Unterscheidung der Varietäten *rubescens* und *stoloniferum*) bei vielen Funden nicht sicher zu beobachten, was auf ein Vorkommen der seltenen Varietät *stoloniferum* hingedeutet hätte. Im Jahre 1982 war ein schnelles Gilben dagegen nur bei wenigen Fruchtkörpern zweifelhaft. Funde, die als *stoloniferum* s. l. bezeichnet wurden, waren hinsichtlich der Peridienverfärbung nicht eindeutig. In der Übersicht (Tab. 1) zeigen sich die Sporenmaße der 3 Formen nur unwesentlich verschieden. Diese Mittelwerte sind gut gesichert, da jeweils von rund 8 Fruchtkörpern je 12 Sporen gezählt wurden.

Ordnet man die Funde (11 x var. *rub.*; 7 x var. *stol.*; 9 x s. l.) nach Fundmonaten ohne Berücksichtigung der Variationen, so ergibt sich ein anderes Bild: Die Sporenlängen bleiben gleich, die Sporenbreiten und damit das Sporenvolumen nehmen jedoch im Mittel von Monat zu Monat um $40 \mu\text{m}^3$ zu (Mai: $420 \mu\text{m}^3$, Juni $460 \mu\text{m}^3$, Juli $500 \mu\text{m}^3$). Das läßt zumindest den Verdacht offen, daß hier verschiedene Reifestadien die Variationen vorgetäuscht haben. Dahin deuten auch Beobachtungen, daß bei unmittelbar nebeneinander gefundenen Fruchtkörpern die allem Anschein nach jungen Fruchtkörper das schnelle Gilben der Peridienschnittfläche zeigten, die älteren nicht.

Die untersuchten 27 Fruchtkörper stellen nur 30–50 % der tatsächlich vorhandenen Fruchtkörper dar, da jeweils nur repräsentative Exemplare gesammelt und untersucht wurden.

6.4 *Rhizopogon luteorubescens* A. H. Smith

Fundort: in der Nachbarschaft alter Kiefern, häufig in Stammnähe. Nähere Beschreibung bei Groß, Runge, Winterhoff (1980) und Smith und Zeller (1966).

Anmerkung: Die Artzuordnung ist nach Groß bei dieser Rhizopogongruppe am ehesten über das Sporenvolumen in Schritten von etwa $15 \mu\text{m}^3$ zweckmäßig. Die Bestimmung der Sporenbreite, die bei $3 \mu\text{m}$ Breite dafür auf $0,1 \mu\text{m}$ genau erfolgen muß, bereitet jedoch Schwierigkeiten, da die nahezu zylindrischen Sporen wegen ihrer optischen Eigenschaften (hyalin bei hohem Brechungsindex im Vergleich zu üblichen Einbettungsmitteln)

eine exakte Bestimmung mit dieser Genauigkeit fragwürdig macht. Für die Volumenbestimmung bedeutet aber eine Abweichung von $0,2 \mu\text{m}$ in der Breitenmessung schon eine Änderung um etwa $5 \mu\text{m}^3$. Wenn auch der einzelne Autor seine Beobachtungsbedingungen reproduzierbar halten kann, ein Vergleich der Messungen verschiedener Autoren zur Artunterscheidung muß diese Unsicherheit berücksichtigen, solange die Meßbedingungen nicht genau angegeben sind.

Hinzu kommen die biologischen Variationen: bei sonst gleichen Fruchtkörpern und Sporenmerkmalen wurden Sporenvolumina zwischen 30 und $54 \mu\text{m}^3$ bestimmt. Vermutlich sind die großen Schwankungen darauf zurückzuführen, daß innerhalb des Sporenkollektivs eines Fruchtkörpers Kollektive verschiedener Größe vorhanden sind. Eine Mittelung kann in solchen Fällen leicht zu einer fehlerhaften Bestimmung führen. Die Untersuchungen von G r o ß machen das Vorkommen verschiedener Sporenkollektive in einem Fruchtkörper sehr wahrscheinlich.

7. Danksagung

Für die Unterstützung bei der Bestimmung der Arten und der Abfassung des Berichts möchte ich mich bei Herrn Dr. G. G r o ß herzlich bedanken.




Bild 1: *Sclerogaster compactus*: a) Fruchtkörperquerschnitt (32x), b) Peridie (100x), c) äußere Peridienschicht mit kristallinen Einlagerungen (800x), d) innere Peridienschicht, Übergang zu *Trametes* (800x), e) Basidien mit Sporen (2000x).

Gautieria morchellaeformis: g–h) Basidiosporen, mikroskopisches Bild bei verschiedener Beleuchtung, i) konstruiertes Sporenbild, j) größter Querschnitt aus Polansicht (2000x).

Literatur

- BRAUN-BLANQUET, J. (1964) – Pflanzensoziologie. 3. Auflage, Wien, New York.
- DODGE, C. W. u. S. M. ZELLER (1936) – Hydnangium and related genera. Ann. Missouri Bot. Gard. 23 (565–598).
- GROSS, G., A. RUNGE u. W. WINTERHOFF (1980) – Bauchpilze (Gasteromycetes s. l.) in der Bundesrepublik und Westberlin. Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie 2 (1–220).
- HAWKER, L. E. (1954) – British hypogeous fungi. Philos. Trans. Roy. Soc. London B 237 (429–546).
- HESSE, R. (1891) – Die Hypogäen Deutschlands. Bd. I, Marburg.
- Klima-Atlas von Baden-Württemberg, Bad Kissingen 1953.
- OBERDORFER, E. (1979) – Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Stuttgart.
- PEGLER, D. N. u. T. W. K. YOUNG (1979) – The gasteroid russulales. Trans. Br. mycol. Soc 72 (353–388).
- SMITH, A. H. u. S. M. ZELLER (1966) – A preliminary account of the north american species of Rhizopogon. Mem. New York Bot. Gard. 14 (2) (1–178).
- SOEHNER, E. (1949) – Deutsche Hydnangiaceae, 2. Teil. Z. Pilzkunde 21 (3) (11–20).
- SVRČEK, M. (1958) – Hysterangiales, Hymenogastrales. In A. Pilát (Ed.), Flora CSR, Vol. B–1, Gasteromycetes, (96–208 u. 715–743).
- TULASNE, L. R. u. C. TULASNE (1851) – Fungi Hypogaei. Reprint Vaals 1970.



Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V.
German Mycological Society


Dieses Werk stammt aus einer Publikation der DGfM.

www.dgfm-ev.de

Über [Zobodat](#) werden Artikel aus den Heften der pilzkundlichen Fachgesellschaft kostenfrei als PDF-Dateien zugänglich gemacht:

- **Zeitschrift für Mykologie**
Mykologische Fachartikel (2× jährlich)
- **Zeitschrift für Pilzkunde**
(Name der Hefreihe bis 1977)
- **DGfM-Mitteilungen**
Neues aus dem Vereinsleben (2× jährlich)
- **Beihefte der Zeitschrift für Mykologie**
Artikel zu Themenschwerpunkten (unregelmäßig)

Dieses Werk steht unter der [Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz](#) (CC BY-ND 4.0).



- **Teilen:** Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen, sogar kommerziell.
- **Namensnennung:** Sie müssen die Namen der Autor/innen bzw. Rechteinhaber/innen in der von ihnen festgelegten Weise nennen.
- **Keine Bearbeitungen:** Das Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht bearbeitet, abgewandelt oder in anderer Weise verändert werden.

Es gelten die [vollständigen Lizenzbedingungen](#), wovon eine [offizielle deutsche Übersetzung](#) existiert. Freigibiger lizenzierte Teile eines Werks (z.B. CC BY-SA) bleiben hiervon unberührt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Mykologie - Journal of the German Mycological Society](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [49_1983](#)

Autor(en)/Author(s): Hintz R.A., Winterhoff Wulfard

Artikel/Article: [Seltene Hypogäen in Mainfranken \(MTB 6223 Wertheim\) 51-60](#)